

Commandino, Federico (1509-1575)

Federici Commandini Vrbinatis Liber de centro grauitatis solidorum. - Bononiae : ex officina Alexandri Benacii, 1565 (Impress. Bononiae). - [4], 47, [1] c. : ill. ; 4º


(IT-MiFBE)958405

The digital reproduction of this work is licensed under a [Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivs 3.0 Unported License](#). Permissions beyond the scope of this license may be available at customer.service@beic.it.

La riproduzione digitale di quest'opera è distribuita con la licenza [Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported](#). Permessi oltre lo scopo di questa licenza possono essere richiesti a customer.service@beic.it.

F E D E R I C I
C O M M A N D I N I
V R B I N A T I S

L I B E R D E C E N T R O
G R A V I T A T I S
S O L I D O R V M.



CVM PRIVILEGIO IN ANNOS X.

B O N O N I A E,

Ex Officina Alexandri Benacii.

M D L X V.

ALEXANDRO FARNESIO
CARDINALI AMPLISSIMO.
ET OPTIMO.



VM multæ res in mathematicis disciplinis nequaquam satis adhuc explicatae sint, tum per difficultis, & perobscura quæstio est de centro grauitatis corporum solidorum; quæ, & ad cognoscendum pulcherrima est, & ad multa, quæ à mathematicis proponuntur, præclare intelligenda maximum affert adiumentum. de qua neminem ex mathematicis, neque nostra, neque patrum nostrorum memoria scriptum reliquissime scimus. & quamuis in earum monumentis literarum nō nulla reperiantur, ex quibus in hanc sententiam adduci possamus, vt existimemus hanc rem ab ijsdē vberime tractatam esse; tamen nescio quo fato adhuc in eiusmodi librorum ignoratione versamur. Archimedes quidem mathematicorū princeps in libello, cuius inscriptio est, *εντρα βάρων ἐπιπέδων*, de centro planorum copiosissime, atque acutissime conscripsit: & in eo explicando summā ingenii, & scientiæ gloriā est cōsecutus. Sed de cognitione cētri grauitatis corporū solidorū nulla in eius libris litera inuenitur. non mullos abhinc annos MARCELLVS II. PONT. MAX.

cum adhuc Cardinalis esset, mihi, quæ sua erat hu-
manitas, libros eiusdem Archimedis de ijs, quæ ve-
hantur in aqua, latine redditos dono dedit. hos cum
ego, ut aliorum studia incitarem, emendados, & cō-
mentariis illustrandos suscepissim, animaduerti dubi-
tari non posse, quin Archimedes vel de hac materia
scripsisset, vel aliorum mathematicorum scripta per-
legisset. nam in iis tum alia nonnulla, tum maxime
illam propositionem, ut euidentem, & aliás proba-
tam assumit, Centrū grauitatis in portionibus conoi-
dis rectanguli axem ita diuidere, ut pars, quæ ad verti-
cem ternainatur, alterius partis, quæ ad basim dupla
sit. Verum hæc ad eam partem mathematicarum
disciplinarum præcipue refertur, in qua de centro
grauitatis corporum solidorum tractatur. non est au-
tem consentaneum Archimedem illum admirabilem
virum hanc propositionem sibi argumentis con-
firmandam existimaturum non fuisse, nisi eam vel
aliis in locis probauisset, vel ab aliis probatam esse
comperisset. quamobrem nequid in iis libris intel-
ligendis desiderari posset, statui hanc etiam partem
vel à veteribus prætermissam, vel tractatam quidem,
sed in tenebris iacentem, non intactam relinquere;
atque ex assidua mathematicorum, præsertim Archi-
medis lectione, quæ mihi in mentem venerunt, ea in
medium afferre; ut centri grauitatis corporum soli-
dorum, si non perfectam, at certe aliquam noti-

tiam haberemus. Quem meum laborem nō mathematicis solum, verum iis etiam, qui naturae obscuritate delectantur, nō iniucundam fore sperauit: multa enim προβλήματα cognitione dignissima, quae ad vtrāque scientiam attinent, se se legentibus obtulissent. neque id ulli mirandum videri debet. vt enī in corporibus nostris omnia membra, ex quibus certa quaedam officia nascuntur, diuino quodam ordine inter se implicata, & colligata sunt: in iisq; admirabilis illa conspiratio, quam σύμπνωιαν græci vocant, elucecit, ita tres illæ Philosophiæ (ut Aristotelis verbo utar) quæ veritatem solam propositam habent, licet quibusdam quasi finibus suis regantur: tamen earū unaquæque per se ipsam quodammodo imperfecta est: neque altera sine alterius auxilio plene comprehendi potest. complures præterea mathematicorum nodi ante hac explicatu difficillimi nullo negotio expediti essent: atque (ut uno verbo complectar) nisi mea vaide amo, tractationem hanc meani studiosis non mediocrem utilitatem, & magnam voluptatem allaturam esse mihi persuasi. cum autem ad hoc scribendum aggressus essem, allatus est ad me liber Francisci Maurolici Messancensis, in quo vir ille doctissimus, & in iis disciplinis exercitatisimus affirmabat se de centro gravitatis corporum solidorum conscripsisse. cum hoc intellexisset, sustinui me paulisper: tacitusque expectauit, dum opus cla-

rissimi uiri , quem semper honoris cauſſa nomino ,
in lucerh proferretur : mihi enim exploratissimum
erat : Franciscum Maurolicum -multo doctius , &
exquisitus hoc disciplinarum genus scriptis suis tra-
diturum . sed cum id tardius fieret , hoc est , ut ego
interpretor , diligentius , mihi diutius hac ſcriptione
non supersedendum eſſe duxi , præſertim cum iam li-
bri Archimedis de iis , quæ uehuntur in aqua , opera
mea illuſtrati typis excudēdi eſſent . nec me alia cauſ-
ſa impuliffeſſet , ut de centro grauitatis corporum foli-
dorum ſcriberem , niſi ut hac etiam ratione lux eis
quām maxime fieri poſſet afferretur . atq; id eō mihi
faciendum exiſtiaui , quōd in ſpem ueniebam fore ,
ut cum ego ex omnibus mathematicis primus , hanc
materiam explicandam fuſcepifsem ; ſi quid errati for-
te à me commiſſum eſſet , boni uiri potius id mea de
ſtudiosiſ hominibus bene merēdi cupiditati , quām
arrogantia ascriberent . reſtabat ut conſiderarem , cui
potiſſimum ex principiibus uiris contemplationem
hanc , nunc prium memoriae , ac literis proditam de-
dicarem . harum mearum cogitationum ſumma fa-
cta , exiſtiaui nemini conuenientius de centro graui-
tatis corporum opus dicari oportere , quām ALEXAN-
DRO FARNESIO grauiſſimo , ac prudentiſſi-
mo Cardinali , quo in uiro ſumma fortuna ſemper cū
ſumma virtute certauit . quid enim maxime in te ad-
mirari debeant homines , obſcurum eſt ; uſum' ne re-

rum, qui pueritiae tempus extreum principium habuisti, & imperiorū, & ad Reges, & Imperatores honorificentissimarum legationum; an excellentiam in omni genere literarum, qui vix adolescētulus, quæ homines iam confirmata ætate summo studio, diuturnisq; laboribus didicerunt, scientia, & cognitione comprehendisti: an consilium, & sapientiam in regendis, & gubernādis Ciuitatibus, cuius grauissimæ sententiæ in sanctissimo Reip. Christianæ consilio dīctæ, potius diuina oracula, quām sententiæ habitæ sunt, & habentur. prætermitto liberalitatem, & munificentiam tuam, quam in studiosissimo quoque honestando quotidie magis ostendis, ne videar auribus tuis potius, quām veritati seruire. quamuis à te in tot præclaros viros tanta beneficia collata sunt, & conferuntur, vt omnibus testatum sit, nihil tibi esse charius, nihil iucundius, quām eximia tua liberalitate homines ad amplexandam virtutem, licet currentes incitare. nihil dico de ceteris virtutibus tuis, quæ tantæ sunt, quantæ ne cogitatione quidem comprehendendi possunt. Quamobrem hac præcipue de causa te huius meæ lucubrationis patronum esse volui, quam ea, qua soles, humanitate accipies. te enim semper ob diuinis virtutes tuas colui, & obseruaui: nihilq; mihi fuit optatius; quām tibi perspectum esse meum erga te animum; singularemq; obseruantiam. cœlum igitur digito attingam, si post grauissimas oc-

cupationes tuas legendo Federici tui libro aliquid
impertiri temporis non grauaberis : cumq; in iis, qui
tibi semper addicti erunt, numerare. Vale.

Federicus Commandinus.

FEDERICI COMMANDINI
VRBINATIS LIBER DE CENTRO
GRAVITATIS SOLIDORVM.

DEFINITIONES.



ENTRVM grauitatis, Pappus
Alexandrinus in octauo ma-
thematicarum collectionum
libro ita diffiniuit.

λέγουσεν δὲ κέντρον βάρους ἐκάστου σα-
ματού οὐν τὸν σημεῖον τῆς κείμενος έντος, ἀφ
οὗ καὶ τὸ ποινικόν ἀρτίθεν τὸ βάρος ἡμέραι
φερονεκούντων φυγάσσεται τὸ κέντρον βέ-
στιν, οὐ μητέριτεπ θέμενον έντι φορά. hoc est,

Dicimus autem centrum grauitatis uniuscuiusque corporis punctum, quoddam intra positi-
tum, à quo si graue appensum mente concipiatur, dum fertur quiescit; & seruat eam, quam in
principio habebat positionem: neque in ipsa lati-
tione circumueritur.

Possimus etiam hoc modo diffinire.

Centrum grauitatis uniuscuiusque solidæ figu-
ræ est punctum illud intra positiū, circa quod
undique partes æqualium momentorum consi-
stunt. si enim per tale centrum ducatur planum
figuram quomodoconque secans semper in par-

F E D . C O M M A N D I N I

- tes æque ponderantes ipsam diuidet.
- 2 Prismatis, cylindri , & portionis cylindri axem appello rectam lineam , quæ oppositorum planorum centra grauitatis coniungit.
 - 3 Pyramidis, coni , & portionis coni axem dico linem , quæ à uertice ad centrum grauitatis basis perducitur.
 - 4 Si pyramidis, conus, portio coni, uel conoidis se-
cetur piano bâsi æquidistante, pars, quæ est ad basim, frustum pyramidis, coni, portionis coni , uel conoidis dicetur ; quorum plana æquidistantia , quæ opponuntur similia sunt , & inæqualia : axes vero sunt axium figurarum partes , quæ in ipsis comprehenduntur.

P E T I T I O N E S .

- 1 Solidarum figurarum similiūm centra grauitatis similiter sunt posita.
- 2 Solidis figuris similibus , & æqualibus inter se aptatis, centra quoque grauitatis ipsarum inter se aptata erunt .

T H E O R E M A I . P R O P O S I T I O I .


- 1 Omnis figuræ rectilineæ in circulo descriptæ , quæ æqualibus lateribus , & angulis contingit.

DE CENTRO GRAVIT. SOLID.

per centrum grauitatis est idem, quod circuli centrum.

Sit primo triangulum æquilaterum $a b c$ in circulo descriptum: & diuisa a c bisariam in d , ducatur $b d$. erit linea $b d$ centrum grauitatis triâguli $a b c$, ex tertia decima primi libri Archimedis de centro grauitatis planorum. Et quoniam linea $a b$ est æqualis linea $b c$; & $a d$ ipsi $d c$; estq; $b d$ utriusque communis: triangulum $a b d$ æquale erit triangulo $c b d$: & anguli angulis æquales, qui æqualibus lateribus subtenduntur. ergo anguli ad d utriq; recti sunt. quod cum linea $b d$ fecet a b bisariam, & ad angulos rectos; in ipsa $b d$ est centrum circuli. quare in eadem $b d$ linea erit centrum grauitatis trianguli, & circuli centrum. Similiter diuisa $a b$ bisariam in e , & ducta $c e$, ostendetur in ipsa utrūque centrum contineri. ergo ea erunt in punto, in quo lineæ $b d, c e$ conuenient. trianguli igitur $a b c$ centrum grauitatis est idem, quod circuli centrum.


Sit quadratum $a b c d$ in circulo descriptum: & ducantur $a c, b d$, quæ conueniant in e . ergo punctum e est centrum grauitatis quadrati, ex decima eiusdem libri Archimedis. Sed cum omnes anguli ad $a b c d$ recti sint; erit $a b c$ semicirculus: itemq; $b c d$: & propterea linea $a c, b d$ diametri circuli:



8. primi.

13. primi.

corol. pri
mæ tertii




31. tertii.

F E D. C O M M A N D I N I

Quæ quidem in centro conueniunt, idem igitur est centrum grauitatis quadrati, & circuli centrum.

Sit pentagonum æquilaterum, & æquiangulum in circulo descriptum a b c d e: & iuncta b d, bifariamq; in f dicitur, ducatur c f, & producatur ad circuli circumferentiam in g; quæ lineam a e in h secet: deinde iungantur a c, c e. Eodem modo, quo supra demonstrabimus angulum b c f æqualem esse angulo d c f; & angulos ad f utrosque rectos: & idcirco lineam c f g per circuli centrum transire. Quoniam igitur latera c b, b a, & c d, d e æqualia sunt; & æquales anguli c b a, c d e: erit basis c a basi c e, & angulus b c a angulo d c e æqualis. ergo & reliquo a c h, reliquo e c h. est autem c h, utriusque triangulo a c h, e c h communis. quare Basis a h æqualis est basis h e: & anguli, qui ad h recti: suntq; recti, qui ad f. ergo lineæ a e, b d inter se se æquidistant. Itaque cum trapezij a b d e latera b d, a e æquidistantia à linea f h bifariam dividantur, centrum grauitatis ipsius erit in linea f h, ex ultima eiusdem libri Archimedis. Sed trianguli b c d centrum grauitatis est in linea c f. ergo in eadem linea c h est centrum grauitatis trapezij a b d e, & trianguli b c d: hoc est pentagoni ipsius centrum: & centrum circuli. Rursus si iuncta a d, bifariamq; secta in k, ducatur e k l: demonstrabimus in ipsa utrumque centrum in esse. Sequitur ergo, ut punctum, in quo lineæ c g, e l conueniunt, idem sit centrum circuli, & centrum grauitatis pentagoni.

Sit hexagonum a b c d e f æquilaterum, & æquiangulum in circulo designatum: iunganturq; b d, a e: & bifariam se-



1. primi.

2. primi.



13. Archi-
medis.

82

DE CENTRO GRAVIT. SOLID. 3

& a b d ī g punc̄to, ducatur c g; & protrahatur ad circulū usque circumferentiam; quæ secet a e in h. Similiter concludemus c g per centrum circuli transire: & bifariam seare lineam a e; itemq; lineas b d, a e inter se æquidistantes esse. Cum igitur c g per centrum circuli transeat; & ad punctū f perueniat necesse est: quod c d e f sit diuidium circumferentia circuli. Quare in eadem diametro c f erunt centra grauitatis triangulorum b c d, a f e, & quadrilateri a b d e, ex quibus constat hexagonum ab c d e f. perspicuum est igitur in ipsa c f esse circuli centrum, & centrum grauitatis hexagoni. Rursus ducta altera diametro a d, eisdem rationibus ostendemus in ipsa utrumque centrum inesse. Centrum ergo grauitatis hexagoni, & centrum circuli idem erit.

Sit heptagonum a b c d e f g æquilaterum atque æquianulum in circulo descriptum: & iungantur c e, b f, a g: diuisa autem c e bifariam in pūcto h: & iuncta dh producatur in k. non aliter demonstrabimus in linea d k esse centrum circuli, & centrum grauitatis trianguli c d e, & trapeziorum b c e f, a b f g, hoc est centrum totius heptagoni; & rursus eadem centra in alia diametro cl similiter ducā contineri. Quare & centrum grauitatis heptagoni, & centrum circuli in idem punc̄um conueniunt. Eodem mo-



F E D. C O M M A N D I N I

Quo in reliquis figuris æquilateris, & æquiangulis, quæ in circulo describuntur, probabimus cœtrum gravitatis earum, & centrum circuli idem esse. quod quidem demonstrare oportebat.

Ex quibus apparet cuiuslibet figuræ rectilineæ in circulo plane descriptæ centrum gravitatis idem esse, quod & circuli centrum.

Proprietas Figuram in circulo plane descriptam appellamus, cuiusmodi est ea, quæ in duodecimo elementorum libro, propositione secunda describitur. ex æqualibus enim lateribus, & angulis constare perspicuum est.

T H E O R E M A II. P R O P O S I T I O II.


Omnis figuræ rectilineæ in ellipsi plane descriptæ centrum gravitatis est idem, quod ellipsis centrum.

Quo modo figura rectilinea in ellipsi plane describatur, docuimus in commentarijs in quintam propositionem libri Archimedis de conoidibus, & sphæroidibus.

Sit ellipsis abcd, cuius maior axis ac, minor bd. iunganturq; ab, bc, cd, da: & bisariam diuidantur in punctis e fg h. à centro autem, quod sit k ductæ lineæ ke, kf, kg, kh usque ad sectionem in puncta lmno protrahantur: & iungantur lm, mn, no, ol, ita ut ac fecet lineas lo, mn, in z φ punctis & bd fecerit lm, on in χ ψ. erunt lk, kn linea una, itemque linea una ipse nk, ko: & linea ba, cd æquidistabunt lineæ mo: & b c, ad ipsi bn. rursus lo, mn axi b d æquidistabunt: & lm,

DE CENTRO GRAVIT. SOLID. 4

o n i ipsi a c. Quoniam enim triangulorum a b k, a d k, latus b k est aquale lateri k d, & a k utriusque commune; anguliq; ad. k recti: basis ab, basi ad; & reliqui anguli reliq;is angulis aequales erunt. eadem quoqueratione ostendetur b c equalis c d; & a b ipsi b c. quare omnes a b, b c, c d, d a sunt aequales. & quoniam anguli ad a aequales sunt anguli ad c; erunt anguli b a c, a c d coalterni inter se aequales; itemq; d a c, a c b. ergo c d ipsi b a; & a d ipsi b c aequidistant. At uero cum lineae a b, c d inter se aequidistantes bisariam secentur in punctis e g; erit linea l e k g n diameter sectionis, & linea una, ex demonstratis in uigesima octaua secundi coni corum. Et eadem ratione linea una m f k h o. Sunt autem a d, b c inter se se aequales, & aequidistantes. quare & carum diametra a h, b f; itemq; h d, f e; & quae ipsas coniungunt recte lineae aequales, & aequidistantes erunt. aequidistantia igitur b a, c d diametro in o: & pariter a d, b c ipsi l n aequidistare ostendemus. Si igitur manente diametro a c intelligatur a b c portio ellipsis ad portionem a d c moueri, cum primum b applicuerit ad d, coquunt tota portio toti portioni, lineaq; b a linea ad; & b c ipsi c d congruet: punctum uero e cadet in h; f in g; & linea k e in lineam k h; & k f in k g; quare & e l in h o, et f m in g n. At ipsa l z in z o; et m o in q n cadet. congruet igitur triangulum l k z triangulo o k z: et




F E D. C O M M A N D I N I

triangulum $m k \phi$ triangulo $n k \phi$. ergo anguli $l z k, o z k,$
 $m \phi k, n \phi k$ æquales sunt, ac recti. quod cum etiam recti
 sint, qui ad k ; æquidistant lineæ $l o, m n$ axi $b d.$ & ita
 demonstrabuntur $l m, o n$ ipsi a c æquidistare. Rursus si
 iungantur $a l, l b, b m, m c, c n, n d, d o, o a:$ & bifariam di-
 uidantur: à centro autem k ad divisiones ductæ lineæ pro-
 trahantur usque ad sectionem in puncta $p q r s t u x y:$ & po-
 stremo $p y, q x, r u, s t, q r, p s, y t, x u$ coniungantur. Simili-
 ter ostendemus lineas
 $p y, q x, r u, s t$ axi $b d$ æ-
 quidistantes esse: & $q r,$
 $p s, y t, x u$ æquidistan-
 tes ipsi a c. Itaque dico
 harum figurarum in el-
 lipsi descriptarum cen-
 trum grauitatis esse pū-
 ctum k , idem quod & el-
 lipsis centrum. quadrilateri enim $a b c d$ cen-
 trum est k , ex decima e-
 iusdem libri Archime-
 dis, quippe cù in eo om-
 nes diametri conueniāt.
 Sed in figura $a l b m c n$
 $d o$, quoniam trianguli
 $a l b$ centrum grauitatis

13. Archimedis.

Vltima.

est in linea $l e$: trapezij $q;$ $a b m o$ centrum in linea $e k$: trape-
 zij $o m c d$ in $k g$: & trianguli $c n d$ in ipsa $g n$: erit magnitu-
 dinis ex his omnibus constantis, uidelicet totius figuræ cen-
 trum grauitatis in linea $l n:$ & ob eandem causam in linea
 $o m$: est enim trianguli $a o d$ centrum in linea $o h$: trapezij
 $a l n d$ in $h k$: trapezij $l b c n$ in $k f$: & trianguli $b m c$ in $f m.$
 cum ergo figuræ $a l b m c n d o$ centrum grauitatis sit in li-
 nea $l n$, & in linea $o m$; erit centrum ipsius punctum k , in
 quo





quo scilicet $l\eta$, o m cōueniunt. Postremo in figura a p l q b r m s c t n u d x o y centrum grauitatis trianguli p a y, & trapezii p l o y est in linea a z: trapeziorum vero l q x o, q b d x cētrū est in linea z k: & trapeziorū b r d, r m n u in k φ: & denique trapezii m s t n; & trianguli s c t in φ c. quare magnitudinis ex his compositæ centrū in linea a c consistit. Rursus trianguli q b r, & trapezii q l m r centrum est in linea b x: trapeziorum l p s m, p a c s, a y t c, y o n t in linea x φ: trapezii q; o x u n, & trianguli x du centrum in ↓ d. totius ergo magnitudinis centrum est in linea b d. ex quo sequitur, centrum grauitatis figuræ a p l q b r m s c t n u d x o y esse pūctū K, lineis scilicet a c, b d commune, quæ omnia demonstrare oportebat.

THEOREMA III. PROPOSITIO III.

Cuiuslibet portio-
nis circuli, & ellipsis,
quæ dimidia non sit
maior, centrum graui-
tatis in portionis dia-
metro consistit.

HOC eodem prorsus modo demonstrabitur, quo in libro de centro grauitatis planorum ab Archimede demonstratū est, in portione cōtentâ recta linea, & rectanguli coni sectione grauitatis cētrum esse in diametro portionis. Et ita demonstrari po-



B

FED. COMMANDINI

test in portione, quæ rectilinea & obtusi anguli coni se-
ctione, seu hyperbola continetur.


THEOREMA IIII. PROPOSITIO IIII.

IN circulo & ellipsi idem est figuræ & graui-
tatis centrum.

SIT circulus, uel ellipsis, cuius centrum a. Dico a gra-
uitatis quoque centrum esse. Si enim fieri potest, sit b cen-
trum gravitatis: & iuncta a b extra figuram in c produca-
tur: quam uero proportionem habet linea c a ad a b, ha-
beat circulus a ad aliud circulum, in quo d; uel ellipsis ad
aliam ellipsem: & in circulo, uel ellipsi figura rectilinea pla-
ne describatur adeo, ut tandem relinquantur portiones
quædam minores circulo, uel ellipsi d; que figura sit e f g
h k l m n. Illud uero in circulo fieri posse ex duodecimo
elementorum libro, propositione secunda manifeste con-
stat; at in ellipsi nos demonstra-
uius in commentariis in quin-
tam propositionem Archimedis
de conoidibus, & sphæroidibus.
erit igitur a centrum gravitatis
ipsius figuræ, quod proxime ostē-
dimus. Itaque quoniam circulus
a ad circulum d, uel ellipsis a ad
ellipsem d eandem proportionem
habet, quam linea c a ad a b:
portiones uero sunt minores cir-
culo uel ellipsi d: habebit circu-
lus, uel ellipsis ad portiones ma-
iorem proportionem, quam c a
ad a b: & diuidenda figura recti-
linea e f g h k l m n ad portiones

et. quinti

ix. quinti
apud Cā
panum.



habebit

D E C E N T R O G R A V I T . S O L I D .


6

habebit maiorem proportionē,
quam c b ad h a. fiat o b ad b a,
ut figura rectilinea ad portio-
nes . cum igitur à circulo , uel el-
lipsi , cuius grauitatis centrum
est b , auferatur figura rectilinea
e f g h k l m n , cuius centrum a ;
reliquæ magnitudinis ex portio-
nibus compositæ centrum graui-
tatis erit in linea a b producta ,
& in puncto o , extra figuram po-
sito . quod quidem fieri nullo mo-
do posse perspicuum est . sequi-
tur ergo , ut circuli & ellipsis cen-
trum grauitatis sit punctum a ,
idem quod figuræ centrum .


A L I T E R .

Sit circulus , uel ellipsis a b c d ,
cuius diameter d b , & centrum e : ducaturq; per e rectalli-
nea a c , secans ipsam d b ad rectos angulos . erunt a d c ,
a b c circuli , uel ellipsis dimidiae portiones . Itaque quo-
niam por-
tiōis a d c
cétrū grā-
uitatis est
in diamet-
ro d e : &
portionis
a b c cen-
trum est i
ipsa e b : to
tius circū
li , uel ellipsis grauitatis centrum erit in diametro d b .

Sit autem portionis a d c cétrū grauitatis f . & sumatur




8. Archimedis.



DE FED. I COMMANDINI

in linea e b punctū g, ita ut sit g e æqualis e f. erit g portionis a b c centrum . nam si hæ portiones , quæ æquales & similes sunt, inter se se aptentur, ita ut b e cadat in d e, & punctum b in d cadet; & g in f: figuris autem æqualibus, & similibus inter se aptatis , centra quoque grauitatis ipsarum inter se aptata erunt, ex quinta petitione Archimedis in libro de centro grauitatis planorum. Quare cum portionis a d c centrum grauitatis sit f: & portionis a b c centrum g: magnitudinis; quæ ex utrisque efficitur: hoc est circuli uel ellipsis grauitatis centrum in medio linea f g, quod est e, consistet, ex quarta propositione eiusdem libri Archimedis . ergo circuli, uel ellipsis centrum grauitatis est idem , quod figuræ centrum . atque illud est, quod demonstrare oportebat.

Ex quibus sequitur portionis circuli, uel ellipsis, quæ dimidia maior sit, centrum grauitatis in diametro quoque ipsius consistere.




Sit enim maior portio a b c, cuius diameter b d, & compleatur circulus, uel ellipsis, ut portio reliqua sit a e c, dia metrum

metrum habens e d. Quoniam igitur circuli uel ellipsis a e c b grauitatis centrum est in diametro b e, & portionis a e c centrum in linea e d: reliquæ portionis, uidelicet a b c centrum grauitatis in ipsa b d consistat necesse est, ex octaua propositione eiusdem.

THEOREMA V. PROPOSITIO V.

SI prisma secetur piano oppositis planis æqui distante, se^ctio erit figura æqualis & similis ei, quæ est oppositorum planorum, centrum grauitatis in axe habens.

Sit prisma, in quo plana opposita sint triangula a b c, d e f; axis g h: & secetur piano iam dictis planis æquidistant^e; quod faciat sectionem k l m; & axis in p^ucto n occurrat. Dico k l m triangulum æquale esse, & simile triangulis a b c d e f; atque eius grauitatis centrum esse punctum n. Quoniam enim plana a b c K l m æquidistantia secā tur a plano a e; rectæ lineæ a b, K l, quæ sunt ipsorum cōmunes sectio[n]es inter se se æquidistant. Sed æquidistant a d, b e; cum a e sit parallelogrammum, ex prifmatis diffinitione. ergo & a l parallelogrammū erit; & propterea linea k l, ipsi a b æqualis. Similiter demonstrabitur l m æquidistant, & æqua lis b c; & m k ipsi a.

16. andē
cimi.

34. primi


FED. COMMANDINI

10. unde
cimi

Itaque quoniam duæ lineæ Kl , lm se se tangentes, duab us
lineis se se tangentibus ab , bc æquidistant; nec sunt in e o-
dem plano: angulus xlm æqualis est angulo abc : & ita an-
gulus lmk , angulo bca , & $m x l ipsi cab$ æqualis probabi-
tur. triangulum ergo xlm est æquale, & simile triangulo
 abc . quare & triangulo def . Ducatur linea cgo , & per ip-
sam, & per e fducatur planum secans prisma, cuius & paral-
lelogramni a e communis sectio sit opq . transibit linea
 fq per h , & mp per n . nam cum plana æquidistantia secen-
tur à piano cq , communes eorum sectiones cgo , mp , fq
sibi ipsis æquidistantabunt. Sed & æquidistant ab , xld e. an-
guli ergo aoc , xpm , dqf inter se æquales sunt: & sunt
æquales qui ad puncta akd constituuntur. quare & reliqui
reliquis æquales; & triangula aoc , Kmp , dqf inter se simi-
lia erunt. Ut igitur ca ad a_0 , ita fd ad dq : & permutando
ut ca ad fd , ita a_0 ad dq . est autem ca æqualis fd . ergo &
 a_0 ipsi dq . eadem quoque ratione & a_0 ipsi Kp æqualis
demonstrabitur. Itaque si triangula, abc , def æqualia &
similia inter se aptetur,

per s. pe-
titionem
Archime-
dis.

cadet linea fq in lineam
 cgo . Sed & centrū gra-
uitatis h in g centrū ca-
det. trāsibit igitur linea
 fq per h : & planum per
 co & cf ductū per axē
 gh ducetur: idcircoq; li-
neam mp etiā per n trā-
sire necesse erit. Quo-
niam ergo fh , cg æqua-
les sunt, & æquidistantes:
itemq; hq , go ; rectæ li-
neæ, quæ ipsas cōnectūt
 cml , gnh ; opq æqua-
les & æquidistantes erūt.



æqui-

æquidistant autem c g o, m n p. ergo parallelogramma sunt o n, g m, & linea m n æqualis c g; & n p ipsi g o. aptatis igitur x l m, a b c triāgulis, quæ æqualia & similia sūt; linea m p in c o, & punctum n ing cadet. Quod cū g sit centrum gravitatis trianguli a b c, & n trianguli x l m gravitatis centrum erit id, quod demonstrandum relinquebatur. Similiter idem contingere demonstrabimus in aliis prismatibus, siue quadrilatera, siue plurilatera habeant plana, quæ opponuntur.

C O R O L L A R I V M.

Ex iam demonstratis perspicue apparet, cuiuslibet prismatis axem, parallelogrammorum lateribus, quæ ab oppositis planis ducuntur æquidistare.

THEOREMA VI. PROPOSITIO VI.

Cuiuslibet prismatis centrum gravitatis est in plano, quod oppositis planis æquidistans, reliquorum planorum latera bifariam diuidit.


Sit prisma, in quo plana, quæ opponuntur sint triangula a c e, b d f; & parallelogrammorum latera a b, c d, e f bifariam diuidatur in punctis g h k: per divisiones autem planum ducatur; cuius sectio figura g h k. erit linea g h æquidistans lineis a c, b d & h k ipsis c e, d f. quare ex decima quinta undecimi elementorum, planum illud planis a c e, b d f æquidistabit, & faciet sectionem figuram 33. primi ipsiæ quallem, & similem, ut proxime demonstravimus. Dico centrum gravitatis prismatis esse in plano g h k. Si enim fieri potest, sit eius centrum l: & ducatur l m usque ad planum g h k, quæ ipsi a b æquidister.

33. primi

j. huius

FED. COMMANDINI


z. decimi ergo linea a g continenter in duas partes æquales diuisa, relinquetur tādem pars aliqua n g, quæ minor erit l m. Vtraque uero linearum a g, g b diuidatur in partes æquales ipsi n g: & per puncta diuisionum plana oppositis planis æquidistantia ducantur. erunt sectiones figuræ æquales, ac similes ipsis a c e, b d f: & totum prisma diuisum erit in prismata æqualia, & similia: quæ cum inter se congruat, & gravitatis centra sibi ipsis congruentia, respondentiaq; habebunt. Itaq: sunt magnitudines quædā æquales ipsis n h, & numero pates, quarum centra grāuitatis in eadē reæta linea consti-tuuntur: duæ ue-ro mediæ æquales sunt: & quæ ex utraque parte ipsarum simili-ter æquales: & æquales rectæ li-næ, quæ inter grāuitatis centra interiiciuntur. quare ex corolla-rio quintæ pro-positionis primi libri Archimedis de centro grāuitatis planorum; magnitudinis ex his omnibus compositæ centrum grāuitatis est in medio linea, quæ magnitudi-num mediarum centra coniungit. at qui non ita res ha-bet,



DE CENTRO GRAVIT. SOLID.

9

bet, si quidem 1 extra medias magnitudines positum est.
Constat igitur centrum gravitatis prismatis esse in plano



g h k , quod nos demonstrandum proposuimus . At si opera plana in prisma sunt quadrilatera, vel plurilatera , eadem erit in omnibus demonstratio.


THEOREMA VII. PROPOSITIO VII.

Cuiuslibet cylindri, & cuiuslibet cylindri portionis centrum gravitatis est in plano, quod basibus aequidistans, parallelogrammi per axem latera bifariam secat.


C

F E D . C O M M A N D I N I

SIT cylindrus, uel cylindri portio a c: & piano per axis ducto secetur; cuius sectio sit parallelogramnum ab cd: & bifariam diuisis a d,b,c parallelogrammi lateribus, per diuisionum puncta e f planum basi æquidistantes ducentur; quod faciet sectionem, in cylindro quidem circulum æqualem iis, qui sunt in basibus, ut demonstrauit Serenus in libro cylindricorum, propositione quinta: in cylindri uero portione ellipsem æqualem, & similem eis, quæ sunt in oppositis planis, quod nos demonstrauimus in commen tariis in librum Archimedis de conoidibus, & sphæroidibus. Dico centrum grauitatis cylindri, uel cylindri portionis esse in plano e f. Si enī fieri potest, fit centrum g: & ducatur g h ipsi ad d æquidistantes, usque ad e f planum. Itaque linea a e continenter diuisa bifariam, erit tandem pars aliqua ipsius k e, minor g h. Diuidantur ergo lineæ a e, e d in partes æquales ipsi k e: & per diuisiones planas basibus æquidistantia ducantur. erunt iam sectiones, figuræ æquales, & similes eis, quæ sunt in basibus: atque erit cylindrus in cylindros diuisus: & cylindri portio in portiones æquales, & similes ipsi k f. reliqua similiter, ut superius in prisme concludentur.



THE O-



THEOREMA VIII. PROPOSITIO VIII.

Cuiuslibet prismatis, & cuiuslibet cylindri, uel cylindri portionis grauitatis centrum in medio ipsius axis consistit.

Sit primum a f prisma æquidistantibus planis contentū, quod solidum parallelepipedum appellatur: & oppositorum planorum c f, a h, d a, f g latera bisariam diuidantur in punctis k l m n o p q r s t u x: & per diuisiones ducantur plana k n, o r, s x. communis autem eorum planorum sectiones sint lineæ y z, φ, χ: quæ in punto a conueniāt. erit ex decima eiusdem libri Archimedis parallelogrammi c f centrum grauitatis punctum y; parallelogrammi a h

C


41 FED. COMMANDINI

centrum z: parallelogrammi ad, & parallelogrammi f g, p:
 parallelogrammi d h, x: &
 parallelogrammi c g centru
 d: atque erit ω punctum me
 dium uniuscuiusque axis, ui
 delicet eius linea ω , quae oppo
 sitorum planorū centra con
 iungit. Dico ω centrum esse
 grauitatis ipsius solidi . est
 enim, ut demonstrauimus,
 solidi a f centrum grauitatis
 in plano K n ; quod opposi
 tis planis a d, g f aequidistans
 reliquorum planorum late
 ra bifariam diuidit : & simili
 ratione idem centrum est in plano o r, aequidistante planis
 a e, b f oppositis . ergo in communī ipsorum sectione: ui
 delicet in linea y z . Sed est etiam in plano t u, quod quidē
 y z secat in ω . Constat igitur centrum grauitatis solidi esse
 punctum ω , medium scilicet axium , hoc est linearum, quae
 planorum oppositorū centra coniungunt.

Sit aliud prima a f; & in eo plana, quae opponuntur, tri
 angula a b c, d e f: diuisisq; bifariam parallelogrammorum
 lateribus a d, b e, c f in punctis g h k, per diuisiones planū
 ducatur, quod oppositis planis aequidistans faciet sectionē
 triangulum g h k aequale, & simile ipsis a b c, d e f. Rursus
 diuidatur ab bifariam in l: & iuncta c l per ipsam, & per
 c K f planum ducatur prismā secans, cuius, & parallelogrā
 mi a e communis sectio sit l m n. diuidet punctum m lineam g h bifariam; & ita n diuidet lineam d e: quoniam
 triangula a c l, g k m, d f n aequalia sunt, & similia, ut supra
 demonstrauimus. Iam ex iis, quae tradita sunt, constat cen
 trum grauitatis prismatis in plano g h k contineri. Dico
 ipsum esse in linea k m . Si enim fieri potest, sit o centrum;
 & per


s. huius

s. huius



DE CENTRO GRAVIT. SOLID. II

& per o ducatur o p ad k m ipsi h g æquidistans. Itaque **H** nea h m bifariā usque eò diuidatur, quo ad reliqua sit pars quædam q. m, minor o p. deinde h m , m g diuidantur in partes æquales ipsi m q : & per diuisiones lineæ ipsi m K æquidistantes ducantur . puncta uero, in quibus hæ triangulorum latera secant, coniungantur ductis lineis r s, t u,



x y; quæ basi gh æquidistabunt. Quoniam enim lineæ g z, h α sunt æquales: itemq; æquales g m, m h: ut m g ad g z, ita erit m h, ad h α: & diuidendo, ut m z ad z g, ita m α ad α h. Sed ut m z ad z g, ita k r ad r g: & ut m α ad α h, ita k s ad s h. quare ut k r ad r g, ita k s ad s h. æquidistant igitur inter se r s, g h. eadem quoque ratione demonstrabimus


2. sexti.
11. quinti
2. sexti.

FED. COMMANDINI

19. sexti. xu, xy ipsi gh æquidistare. Et quoniam triangula, que
fiunt à lineis Ky, yu, us, sh æqualia sunt inter se, & similia
triangulo Kmh : habebit triangulum Kmh ad triangulū
 $K\delta y$ duplam proportionem eius, quæ est lineæ $k\delta h$ ad Ky .
sed Kh posita est quadrupla ipsius ky . ergo triangulum
 kmh ad triangulum $K\delta y$ eadē proportionem habebit,
quam sexdecim ad unū: & ad quatuor triangula $k\delta y, yu,$
 us, sh habebit eandem, quam sexdecim ad quatuor, hoc
est quam h K ad ky : & similiter eandem habere demonstra-
bitur trian-
gulum kmg
ad quatuor
triangula $K\delta$
 $x, x\gamma t, t\beta r,$
 $r\gamma g$. quare
totum trian-
gulum Kgh
ad omnia tri-
angula $gzr,$
 $r\beta t, t\gamma x, x\delta$
 $K, K\delta y, yu,$
 us, sh ita
erit, ut h k ad
 ky , hoc est
ut hm ad m
 q . Si igitur in

**2. vel 11.
quinti.**

triangulis abc, def describantur figuræ similes ei, quæ de-
scripta est in gh K triangulo: & per lineas sibi responden-
tes plana ducantur: totum prisma $a f$ diuisum erit in tria
solida parallelepipedâ $y\gamma, u\beta, sz$, quorum bases sunt æqua-
les & similes ipsis parallelogrammis $y\gamma, u\beta, sz$: & in octo
prismata $gzr, r\beta t, t\gamma x, x\delta K, k\delta y, yu, us, sh$: quorum
item bases æquales, & similes sunt dictis triangulis; altitu-
do autem in omnibus, totius prismatis altitudini æqualis.



Itaque solidi parallelepipedi $y\gamma$ centrum gravitatis est in linea $\delta\iota$: solidi $u\beta$ centrum est in linea $\epsilon\eta$: & solidi $s\zeta$ in linea $m\mu$, quae quidem lineæ axes sunt, cum planorum oppositorum centra coniungant. ergo magnitudinis ex his solidis compositæ centrum gravitatis est in linea λm , quod sit θ ; & iuncta θo producatur: à puncto autem h ducatur $h\mu$ ipsi $m\lambda$ æquidistant, quæ cum θo in μ conueniat. triangulum igitur ghk ad omnia triangula $gxr, r\beta t, t\gamma x, x\delta k, k\lambda y, yu, us, s\alpha h$ eandem habet proportionem, quam $h\mu$ ad $m\lambda$; hoc est, quam $\mu\theta$ ad $\lambda\theta$: nam si $h\mu$, $\mu\theta$ produci intelligantur, quo usque coeant; erit ob linearum $qy, m\lambda$ æquidistantiam, ut $h\mu$ ad qy , ita $\mu\theta$ ad $\lambda\theta$. linea uero θo maior est, quam $\theta\lambda$: habebit igitur $\mu\theta$ ad $\theta\lambda$ maiorem proportionem, quam ad θo . quare triangulum etiam ghk ad omnia iam dicta triangula maiorem proportionem habebit, quam $\mu\theta$ ad θo . sed ut triangulum ghk ad omnia triangula, ita totū prisma a fad omnia prismata $gxr, r\beta t, t\gamma x, x\delta k, k\lambda y, yu, us, s\alpha h$: quoniam enim solida parallelepipedæ æque alta, eandem inter se proportionem habent, quam bases; ut ex trigesimasecunda undecimi elementorum constat. sunt autem solida parallelepipedæ prismatum triangulares bases habentium dupla: sequitur, ut etiam huiusmodi prismata inter se sint, sicut eorum bases. ergo totum prisma ad omnia prismata maiorem proportionem habet, quam $\mu\theta$ ad θo : & diuidendo solida parallelepipedæ $y\gamma, u\beta, s\zeta$ ad omnia prismata proportionem habent maiorem, quam μo ad $o\theta$. fiat θo ad $o\theta$, ut solida parallelepipedæ $y\gamma, u\beta, s\zeta$ ad omnia prismata. Itaque cum à prismate a f, cuius cætrum gravitatis est o , auferatur magnitudo ex solidis parallelepipedis $y\gamma, u\beta, s\zeta$ constans: atque ipius gravitatis centrum sit θ : reliqua magnitudinis, quæ ex omnibus prismatis constat, gravitatis centrum erit in linea θo producta: & in puncto v , ex octaua propositione eiusdem libri Archi-

8. quint.


28. unde
cimi

15. quinti

10. quinti
apud Cā
panum.

FED. COMMANDINI

medis. ergo punctum ν extra prismata a f positum, centrum erit magnitudinis cōposita ex omnibus prismatibus g z r, r β t, t γ x, x δ k, k δ y, y u, u s, s α h, quod fieri nullo modo potest. est enim ex diffinitione centrum gravitatis solidarum figurae intra ipsam positum, non extra. quare relinquitur, ut centrum gravitatis prismatis sit in linea K m. Rursum b c bifariam in ξ diuidatur: & ducta a ξ , per ipsam, & per lineam a g d planum ducatur; quod prisma secet: faciatq; in parallelogrammo b f sectionem $\xi \pi$ diuidet punctum π lineam quoque c f bifariam: & erit plani eius, & trianguli g h K communis sectio g u; quod pūctum u in medio linea h K



positum si t. Similiter demonstrabimus centrum gravitatis prismatis in ipsa g u inesse. sit autem planorum c fl, ad $\pi \xi$ communis sectio linea rho tau; que quidem prismatis axis erit, cum transeat per centra gravitatis triangulorum a b c, g h k, de f, ex quartadecima eiusdem. ergo centrum gravitatis prismatis a f est punctum sigma, centrum scilicet trianguli


trianguli $g h K$, & ipsius $\rho \tau$ axis medium.

Sit prima $a g$, cuius opposita plana sint quadrilatera $a b c d$, $e f g h$: secanturq; $a e$, $b f$, $c g$, $d h$ bifariam: & per distinctiones planum ducatur; quod sectionem faciat quadrilaterum $K l m n$. Deinde iuncta $a c$ per lineas $a c$, $a e$ ducatur planum secas prisma, quod ipsum diuidet in duo prismata triangulares bases habentia $a b c$, $e f g$, $a d c e h g$. Sint autem triangulorum $a b c$, $e f g$ gravitatis centra $o p$: & triangulorum $a d c$, $e h g$ centra $q r$: iunganturq; $o p$, $q r$; quae plane $k l m n$ occurrant in punctis $s t$. erit ex iis, quae demonstrauimus, punctum s gravitatis centrum trianguli $K l m$; & ipsius prismatis $a b c e f g$: punctum uero t centrum gravitatis trianguli $K n m$, & prismatis $a d c e h g$. iunctis igitur $o q$, $p r$, $s t$, erit in linea $o q$ centrum gravitatis quadrilateri $a b c d$, quod sit u : & in linea $p r$ centrum quadrilateri $e f g h$ sit autem x . denique iungatur $u x$, quae fecit lineam $s t$ in y . se habet enim cum sint in eodem

plane atq; erit y gravitatis centrum quadrilateri $K l m n$.

Dico idem punctum y centrum quoque gravitatis esse totius prismatis. Quoniam enim quadrilateri $K l m n$ gravitatis centrum est y : linea $s y$ ad $y t$ eadem proportionem habebit, quam triangulum $K n m$ ad triangulum $K l m$, ex 8. Archimedis de centro gravitatis planorum. Ut autem triangulum $K n m$ ad ipsum $K l m$, hoc est ut triangulum $a d c$ ad triangulum $a b c$, aequalia enim sunt, ita prima $a d c$ e $h g$.


D



FED. COMMANDINI


ad prisma a b c e f g. quare linea s y ad y t eadem proportionem habet, quam prisma a d c e h g ad prisma a b c e f g. Sed prismatis a b c e f g centrum grauitatis est s: & prismatis a d c e h g centrum t. magnitudinis igitur ex his compositæ, hoc est totius prismatis a g centrum grauitatis est punctum y; medium scilicet axis u x, qui oppositorum planorum centra coniungit.

Rursus sit prisma basim habens pentagonum a b c d e: & quod ei opponitur sit f g h k l: sec enturq; a f, b g, c h, d k, e l bisariam: & per divisiones ducto plano, sectio sit pentagonum m n o p q. deinde iuncta e b per lineas l e, e b aliud planum ducatur, diuides prisma a k in duo prismata, in prisma scilicet a l, cuius plana opposita sint triangula a b e f g l: & in prima b k, cuius plana opposita sint quadrilatera b c d e g h k l. Sint autem triangulorum a b e, f g l centra grauitatis puncta r s: & b c d e, g h k l quadrilaterorum centra t u: iunganturq; r s, t u occurrentes plano m n o p q in punctis x y. & itidem iungatur r t, s u, x y. erit in linearum cætrum grauitatis pentagoni a b c d e; quod sit z: & in linea s u centrum pentagoni f g h k l: sit autem y: & ducatur z y, quæ ducto plano in d occurrat. Itaq; punctum x est centrum grauitatis trianguli m n q, ac prismatis a l: & y grauitatis centrum quadrilateri n o p q, ac prismatis b k. quare y centrum erit pentagoni m n o p q. & similiter



similiter demonstrabitur totius prismatis a K gravitatis esse centrum. Simili ratione & in aliis prismatibus illud idem facile demonstrabitur. Quo autem pacto in omni figura rectilinea centrum gravitatis inueniatur, docuimus in commentariis in sextam propositionem Archimedis de quadratura parabolæ.

Sit cylindrus, uel cylindri portio c e cuius axis a b : seeturq; plano per axem ducto ; quod sectionem faciat parallelogrammum c d e f: & diuisis c f, d e bisariam in punctis



g h, per ea ducatur planum basi æquidistans, erit sectio g' h circulus, uel ellipsis, centrum habens in axe; quod sit K: atque erunt ex iis, quæ demonstrauimus, centra gravitatis planorum oppositorum puncta a b: & plani g h ipsum k, in quo quidem plano est centrum gravitatis cylindri, uel cylindri portionis. Dico punctum K cylindri quoque, uel cylindri portionis gravitatis centrum esse. Si enim fieri potest, sit l centrum: ducaturq; k l, & extra figuram in m producatur. quam uero proportionem habet linea m K ad k l

4. huius.

D 2


F E D . C O M M A N D I N I

habeat circulus, uel ellipsis g h ad aliud spaciū, in quo u;
 & in circulo, uel ellipsis, plāne describatur rectilinea figura,
 ita ut tādem relinquātur portiones minores spaciū u, quæ
 sit o p q r s h t : descriptaq; simili figura in oppositis pla-
 nis c d, t e, per lineas sibi ipsis respondentes plana ducātur,
 Itaque cylindrus, uel cylindri portio diuidit in prisma,
 cuius quidem basis est figura rectilinea iam dicta, centrum
 que gravitatis punctum K: & in multa solida, quæ probasi
 bus habent relietas portiones, quas nos solidas portiones
 appellabimus. cum igitur portiones sint minores spaciū
 u, circulus, uel ellipsis g h ad portiones maiorem propor-
 tionem habebit, quam linea m k ad K l. fiat n k ad K l, ut
 circulus uel ellipsis g h ad figuram rectilinciam in ipsa descri-
 ptam, ita est cylindrus uel cylindri portio c e ad prisma,
 quod rectilineam figuram pro basi habet, & altitudinem
 æqualem; id, quod infra demonstrabitur. ergo per conuer-
 sionem rationis, ut circulus, uel ellipsis g h ad portiones re-
 lietas, ita cylindrus, uel cylindri portio c e ad solidas por-
 tiones, quare cylindrus uel cylindri portio ad solidas por-
 tiones candem proportionem habet, quam linea n k ad k l
 & diuidendo prisma, cuius basis est rectilinea figura ad so-
 lidas portiones candem proportionem habet, quam n l ad
 l k, & quoniam a cylindro uel cylindri portione, cuius gra-
 uitatis centrum est l, auferitur prisma basim habens rectili-
 neam figurā, cuius centrū gravitatis est K: residuæ magnitu-
 dinis ex solidis portionibus cōpositæ gravitatis cētrū erit
 in linea k l protracta, & in puncto n; quod est absurdū. relin-
 quitur ergo, ut cētrum gravitatis cylindri; uel cylindri por-
 tionis sit punctū k, quæ omnia demonstrāda proposuimus.

At uero cylindrum, uel cylindri portionē c e
 ad prisma, cuius basis est rectilinea figura in spa-
 cio g h descripta, & altitudo æqualis; eandem ha-
 bere

bere proportionem, quam spacium $g\ h$ ad dictā figuram, hoc modo demonstrabimus.

Intelligatur circulus, uel ellipsis x æqualis figuræ rectilineæ in $g\ h$ spacio descriptæ: & ab x constituatur conus, uel




coni portio, altitudinē habens eandē, quā cylindrus uel cylindrī portio c ē. Sit deinde rectilinea figura, in qua y eadē, quæ in spacio $g\ h$ descripta est: & ab hac pyramis æquealta constituatur. Dico conū uel coni portionē x pyramidī y æqualē esse . nisi enim sit æqualis, uel maior , uel minor erit.

Sit primum maior, et exuperet solidō z . Itaque in circulo, uel ellipsi x describatur figura rectilinea; & in ea pyramidis eandem, quam conus, uel coni portio altitudinem habens, ita ut portiones relictæ minores sint solidō z , quemadmodum docetur in duodecimo libro elementorum propositione undecima . erit pyramidis x adhuc pyramide y maior. & quoniam piramides æque altæ inter se sunt, sicuti bases; pyramidis x ad piramidem y eandem proportionem habet, quam figura rectilinea x ad figuram y . Sed figura recti


6. duodecim.

FED. COMMANDINI



linea x cum sit minor circulo, uel ellipsi, est etiam minor figura rectilinea y . ergo pyramis x pyramide y minor erit. Sed & maior; quod fieri non potest. At si conus, uel coni portio x ponatur minor pyramide y : fit alter conus aequale altus, uel altera coni portio x ipsi pyramidi y æqualis. erit eius basis circulus, uel ellipsis maior circulo, uel ellipsis x , quorum excessus sit spaciū ω . Si igitur in circulo, uel ellipsis x figura rectilinea describatur, ita ut portiones relictæ sint ω spacio minores, eiusmodi figura adhuc maior erit circulo, uel ellipsis x , hoc est figura rectilinea y : & pyramis in ea constituta minor cono, uel coni portione x , hoc est minor pyramide y . est ergo ut x figura rectilinea ad figuram rectilineam y , ita pyramis x ad pyramidem y . quare cum figura rectilinea x sit maior figura y : erit & pyramis x pyramide y maior. sed erat minor; quod rursus fieri non potest. non est igitur conus, uel coni portio x neque maior, neque minor pyramide y . ergo ipsi necessario est æqualis. Itaque quoniam ut conus ad conum, uel coni portio ad co-

ni




ni portionem, ita est cylindrus ad cylindrum, uel cylindri portio ad cylindri portionem: & ut pyramis ad pyramidem, ita prisma ad prisma, cum eadem sit basis, & æqua lis altitudo; erit cylindrus uel cylindri portio x: prismati y æqualis. estq; ut spaciū g h ad spaciū x, ita cylindrus, uel cylindri portio c e ad cylindrum, uel cylindri portionem x. Constat igitur cylindrum uel cylindri portionē c e, ad prisma y, quippe cuius basis est figura rectilinea in 7. quinti spacio g h descripta, candem proportionem habere, quam spaciū g h habet ad spaciū x, hoc est ad dictam figuram. quod demonstrandum fuerat.

THEOREMA IX. PROPOSITIO IX.

Si pyramis seceretur plāno basī æquidistante; sec̄tio erit figura similis ei, quæ est basis, centrum gravitatis in axe habens.

FED. COMMANDINI

SIT pyramis, cuius basi triangulum $a b c$; axis $d e$: & secetur plano basi æquidistante; quod sectione faciat $f g h$; occurratq; axi in puncto k . Dico $f g h$ triangulum esse, ipsi 16. unde
cimi $a b c$ simile; cuius gravitatis centrum est K . Quoniam enim duo plana æquidistantia $a b c$, $f g h$ secantur à plano $a b d$; communes eorum sectiones $a b$, $f g$ æquidistantes erunt: & eadem ratione æquidistantes ipsæ $b c$, $g h$: & $c a$, $h f$. Quod cum duæ lineæ $f g$, $g h$, duabus $a b$, $b c$ æquidistent, nec sint in codem plano; angulus ad g æqualis est angulo ad b : & similiter angulus ad h angulo ad c : angulusq; ad f ei, qui ad a est æqualis. triangulum igitur $f g h$ simile est triangulo $a b c$. At uero punctum K centrum esse gravitatis trianguli $f g h$ hoc modo ostendemus. Ducantur plana per axem, & per lineas $d a$, $d b$, $d c$: erunt communes sectiones $f K$, $a e$ æquidistantes: pariterq; $K g$, $e b$; & $K h$, $e c$: 10. undeci
mi. 16. unde
cimi 10. undeci
cimi quare angulus $K f h$ angulo $e a c$; & angulus $K g f$ ipsi $e a b$ est æqualis. Eadem ratione anguli ad g angulis ad b : & anguli ad h iis, qui ad c æquales erunt. ergo puncta e K in triangulis $a b c$, $f g h$ similiter sunt posita, per sextam positionem Archimedis in libro de centro gravitatis planorum. Sed cum e sit centrum gravitatis trianguli $a b c$, erit ex undecima propositione eiusdem libri, a 10. $& K$ trianguli $f g h$ gravitatis centrum. id quod demonstrare oportebat. Non aliter in ceteris pyramidibus, quod propositum est demonstrabitur.




PRO

PROBLEMA I. PROPOSITIO X.

DATA qualibet pyramide, fieri potest, ut figura solida in ipsa inscribatur, & altera circumscribatur ex prismatibus æqualem altitudinem habentibus, ita ut circumscripta inscriptam excedat magnitudinem, quæ minor sit quacunque solidæ magnitude proposta.

SIT pyramis, cuius basis triangulū a b c; axis d e. Sitq; prisma, quod eandem basim habeat, & axem eundem. Itaque hoc prisma continenter secto bifariam, plano basi æquidistantē, relinquetur tādem prisma quoddam minus proposita magnitude: quod quidem basim eandem habeat, quam pyramis, & axem e f. diuidatur d e in partes æquales ipsi e f in punctis g h k l m n: & per diuisiones plana ducātur: quæ basibus æquidistent, erunt sectiones, triangula ipsi a b c similia, ut proxime ostendimus. ab uno quoque autē horum triangulorum duo prismata construantur; unum quidem ad partes e; alterum ad



FED. COMMANDINI


partes d. in pyramide igitur inscripta erit quædam figura, ex prismatibus æqualem altitudinem habentibus cōstans, ad partes e: & altera circumscripta ad partes d. Sed unumquodque eorum prismatum, quæ in figura inscripta continentur, æquale est prismati, quod ab eodem fit triangulo in figura circumscripta: nam prisma p q prismati p o est æquale; prisma s t æquale prismati s r; prisma x y prismati x u; prisma n z prismati n z; prisma μ ν prismati μ λ; prisma ρ π prismati ρ π; & prisma φ χ prismati φ τ æquale. relinquitur ergo, ut circumscripta figura exuperet inscriptā prismate, quod basim habet a b c triangulum, & axem e f. Illud uero minus est solida magnitudine proposita. Eadē ratione inscribetur, & circumscribetur solida figura in pyramide, quæ quadrilateram, uel plurilaterā basim habeat.

PROBLEMA II. PROPOSITIO XI.

D A T O cono, fieri potest, ut figura solida inscribatur, & altera circumscribatur ex cylindris æqualem habentibus altitudinem, ita ut circumscripta superet inscriptam, magnitudine, quæ solida magnitudine proposita sit minor.

S I T conus, cuius axis b d: & secetur plano per axem ducto, ut sectio sit triangulum a b c: intelligaturq; cylindrus, qui basim eandem, & eundem axem habeat. Hoc igitur cylindro continenter bifariam se&t, relinquetur cylindrus minor solida magnitudine proposita. Sit autem is cylindrus, qui basim habet circulum circa diametrum a c, & axem d e. Itaque diuidatur b d in partes æquales ipsi d e in punctis f g h K l m: & per ea ducantur plana conum secantia; quæ basi æquidistant. erunt sectiones circuli, centra in axi habentes, ut in primo libro conicorum, propositione

tione quarta Apollonius demonstrauit. Si igitur à singulis horum circulorum, duo cylindri fiant; unus quidem ad basis partes; alter ad partes uerticis: inscripta erit in cono solida quædam figura, & altera circumscripta ex cylindris æqualem altitudinem habentibus constans; quorum unusquisque, qui in figura inscripta continetur æqualis est ei, qui ab eodem fit circulo in figura circumscripta. Itaque cylindrus o p æqualis est cylindro o n; cylindrus r s cylindro r q; cylindrus u x cylindro u t est æqualis; & alii aliis similiter. quare constat circumscriptam figuram superare inscriptam cylindro, cuius basis est circulus circa diametrum a c, & axis d e. atque hic est minor solida magnitudine proposita.




PROBLEMA III. PROPOSITIO XII.

D A T A coni portione, potest solida quædam figura inscribi, & altera circumscribi ex cylindri portionibus æqualem altitudinem habentibus; ita ut circumscripta inscriptam exuperet; magnitudine, quæ minor sit solida magnitudine proposita.

FED. COMMANDINI

Figuram clusimodi; & inscribemus, & circumscribemus, ita
ut in cono dictum est.




PROBLEMA IIII. PROPOSITIO XIII.

D A T A sphæræ portione, quæ dimidia sphæra maior non sit, potest solida quædam portio inscribi & altera circumscribi ex cylindrīs æqualem altitudinem habentibus, ita ut circumscripta inscriptam excedat magnitudine, quæ solida magnitudine præposita sit minor.

H O C etiam eodem prorsus modo fiet: atque ut ab Archimedē traditum est in conoidum, & sphæroidum portionibus, propositione uigesima prima libri de conoidibus, & sphæroidibus.

THEO




THEOREMA X. PROPOSITIO XIII.

Cuiuslibet pyramidis, & cuiuslibet coni, vel
coni portionis, centrum gravitatis in axe consistit.

S I T pyramidis, cuius basis triangulum a b c: & axis d e. Dico in linea d e ipsius gravitatis centrum inesse. Si enim fieri potest, sit centrum f: & ab f ducatur ad basim pyramidis linea f g, axi æquidistans: iunctaq; e g ad latera trianguli a b c producatur in h. quam uero proportionem habet linea h e ad e g, habeat pyramidis ad aliud solidum, in quo K: inscribaturq; in pyramide solida figura, & altera circumscribatur ex prismatibus æqualem habentibus altitudinem, ita ut circumscripta inscriptam exuperet magnitudine, quæ solido k sit minor. Et quoniam in pyramide planum basi æquidistans ductum sectionem facit figuram similem ei, quæ est basis; centrumq; gravitatis in axe habentem: erit prismatis s t gravitatis centrū in linea r q; prismatis u x centrum in linea q p; prismatis y z in linea p o; prismatis ν δ in linea o n; prismatis λ μ in linea n m; prismatis γ π in linea l; & denique prismatis ρ σ in linea l c. quare to-

FED. COMMANDINI


ius figuræ inscriptæ centrum grauitatis est in linea r e:
 quod sit τ : τ
 &aque τ f, &
 producta , à
 puncto h du-
 catur linea a-
 xi pyramidis
 æquidistans ,
 quæ cù linea
 τ f conueniat
 in ϕ . habebit
 ϕ τ ad τ f ean-
 dem propor-
 tionem , quā
 h e ad e g .
 Quoniam igi-
 tur excessus ,
 quo circūscri-
 pta figura in-
 scriptam supe-
 rat, minor est
 solidō K ; py-
 ramis ad eun-
 dē excessū ma-
 iorē propor-
 tionē habet ,
 quam ad K so-
 lidum : uideli-
 cet maiorem,
 quam linea h
 e ad e g ; hoc
 est quam ϕ τ
 ad τ f: & propterea multo maiorem habet ad partem ex-
 cessus, quæ intra pyramidem comprehenditur . Itaque ha-
 beat



DE CENTRO GRAVIT. SOLID. 20

beat eam, quam $\chi\tau$ ad τf . erit diuidendo ut χf ad $f \tau$, ita figura solida inscripta ad partem excessus, quæ est intra pyramidem. Cum ergo à pyramidē, cuius gravitatis cētrum est punctum f , solida figura inscripta auferatur, cuius centrū τ : reliquæ magnitudinis constantis ex parte excessus, quæ est intra pyramidem, centrum gravitatis erit in linea τf producta, & in punto χ . quod fieri non potest. Sequitur igitur, ut centrum gravitatis pyramidis in linea $d e$; hoc est in eius axe consistat.


Sit conus, uel coni portio, cuius axis $b d$: & secetur plano per axem, ut sectio sit triangulum $a b c$. Dico centrum gravitatis ipsius esse in linea $b d$. Sit enim, si fieri potest, centrū



e : perq; e ducatur $e f$ axi æquidistans: & quam proportionem habet $c d$ ad $d f$, habeat conus, uel coni portio ad solidum g . inscribatur ergo in cono, uel coni portione soli

F E D. C O M M A N D I N I

da figura, & altera circumscibatur ex cylindris, uel cylindri portionibus, sicuti dictum est, ita ut excessus, quo figura circumscripta inscriptam superat, sit solido g minor. Itaque centrum grauitatis cylindri, uel cylindri portionis q r est in linea p o; cylindri, uel cylindri portionis s t centrum in linea o n; centrum u x in linea n m; y z in m b; y d in l k; λ μ in K h; & denique π centrum in h d. ergo figura




ræ inscriptæ centrum est in linea p d. Sit autem ρ : & iuncta ρ e protendatur, ut cum linea, quæ à pūcto c ducta fuerit axi æquidistans, conueniat in σ . erit $\sigma \rho$ ad ρe , ut c d ad d f: & conus, seu coni portio ad excessum, quo circumscripta figura inscriptam superat, habebit maiorem proportionem, quam $\sigma \rho$ ad ρe . ergo ad partem excessus, quæ intra ipsius superficiem comprehenditur, multo maiorem proportionem habebit. habeat eam, quam $\tau \rho$ ad ρe . erit diuidendo

diuidendo figura solida inscripta ad dictam excessus partem, ut τ e ad $e \rho$. & quoniam à cono, seu coni portione, cuius grauitatis centrum est e , auferatur figura inscripta, cuius centrum ρ : residuæ magnitudinis compositæ ex parte excessus, quæ intra coni, uel coni portionis superficiem continetur, centrum grauitatis erit in linea ρe protracta, atque in punto τ . quod est absurdum. constat ergo centrum grauitatis coni, uel coni portionis, esse in axe $b d$: quod demonstrandum proposuimus.

THEOREMA XI. PROPOSITIO XV.

Cuiuslibet portionis sphæræ uel sphæroidis, quæ dimidia maior non sit: itemq; cuiuslibet portionis conoidis, uel abscissæ plano ad axem recto, uel non recto, centrum grauitatis in axe consistit.

Demonstratio similis erit ei, quam supra in cono, uel coni portione attulimus, ne toties eadem frustra iterentur.




F

FED. COMMANDINI
THEOREMA XII. PROPOSITIO XVI

In sphæra, & sphæroide idem est grauitatis, &
figuræ centrum.

Secetur sphæra, uel sphæroides plano per axem ducto; quod sectionem faciat circulum, uel ellipsem abcd, cuius diameter, & sphæra, uel sphæroidis axis db; & centrum e. Dico e grauitatis etiam centrum esse. Secetur enim altero plano per e, ad planum secans recto, cuius sectio sit circulus circa diametrum ac: erunt ad c, a b c dimidiæ portiones sphærae, uel sphæroidis. & quoniam portionis a d c grauitatis centrum est in linea d, & centrum portionis a b c in ipsa b e; totius sphærae, uel sphæroidis grauitatis centrum in axe db consisset. Quod si portionis a d c centrum grauitatis ponatur esse f: & fiat ipsi f e æqualis eg: punctu g por-



per 2. propositiorem tationis a b c centrum erit. solidis enim figuris similibus & æqualibus inter se aptatis, & centra grauitatis ipsarum inter se aptentur necesse est. ex quo fit, ut magnitudinis, quæ ex utriusque constat, hoc est ipsius sphærae, uel sphæroidis grauitatis centrum sit in medio linea f g, uidelicet in e. Sphæra igitur, uel sphæroidis grauitatis centrum est idem, quod centrum figuræ.


4 Archimedis.

Ex

DE CENTRO GRAVIT. SOLID.

Ex demonstratis perspicue apparet, portioni sphæræ uel sphæroidis, quæ dimidia maior est, centrum grauitatis in axe consistere.


Data enim qualibet maiori portioe, quoniam totius sphæræ, uel sphæroidis grauitatis centrum est in axe; est autem & in axe centrum portionis minoris: reliqua portionis uidelicet majoris centrum in axe necessario consistet.



THEOREMA XIII. PROPOSITIO XVII.

Cuiuslibet pyramidis triangularis basim habentis gravitatis centrum est in punto, in quo ipsius axes conueniunt.

Sit pyramis, cuius basis triangulum a b c, axis d e: sitque trianguli b d c gravitatis centrum f: & iungatur a f. erit & a faxis eiusdem pyramidis ex tertia diffinitione huius. Itaque quoniam centrum gravitatis est in axe d e; est autem & in axe a f; quod proxime demonstrauimus.



FED. COMMANDINI

mus: erit utique gravitatis centrum pyramidis punctum
g: in quo scilicet ipsi axes conueniunt.



THEOREMA XIII. PROPOSITIO XVIII.

Si solidum parallelepipedum secetur plano basibus æquidistante; erit solidum ad solidum, sicut altitudo ad altitudinem, uel sicut axis ad axem.

Sit solidum parallelepipedum abcd efg h, cuius axis κl : seceturq; piano basibus æquidistante, quod faciat sectionem m n o p; & axis in punto q occurrat. Dicò solidum gm ad solidum mc eam proportionem habere, quam altitudo solidi gm habet ad solidi mc altitudinem; uel quam axis κq ad axem ql. Si enim axis Kl ad basis planum sit perpendicularis, & linea gc, quæ ex quinta huius ipsi kl æquidistant, perpendicularis erit ad idem planum, & solidi altitudinem dimetetur. Itaque solidum gm ad solidum mc eam proportionem habet, quam parallelogrammum gn ad parallelogrammum nc, hoc est quam linea go, quæ

undeci
nni.

i. sexti.



cst


est solidi g m altitudo ad o e altitudinem solidi m c, postquam axis k q ad ql axem. Si uero axis k l non sit perpendicularis ad planum basis; ducatur a punto k ad idem planum perpendicularis k r, occurres plano m n o p in s. similiter demonstrabimus solidum g m ad solidum m c ita esse, ut axis k q ad axem ql. Sed ut K q ad ql, ita k s altitudo ad altitudinem s r, nam linea K l, K r a planis æquidistantibus in easdem proportiones secantur, ergo solidum g m ad solidum m c eandem proportionem habet, quam altitudo ad altitudinem uel quam axis ad axem, quod demonstrare oportebat.

17. unde
cimi

THEOREMA XV. PROPOSITIO XIX.

Solida parallelepipedo in eadem basi, uel in æqualibus basibus constituta eam inter se proportionem habent, quam altitudines: & si axes ipsorum cum basibus æquales angulos contineant, eam quoque, quam axes proportionem habebunt.

Sint solida parallelepipedo in eadē basi cōstituta a b c d, a b e f: & sit solidi a b c d altitudo minor: producatur autem planum c d adeo, ut solidum a b e f secet; cuius sectio sit g h: erūt solidū a b c d, a b g h in eadem basi, & æquali altitudine inter se æqualia. Quoniā igitur solidum a b e f secatur piano basibus æquidistāte, erit solidum g h e f ad ipsum a b g h

29. unde
cimi

18. huius



FED. COMMANDINI

ut altitudo ad altitudinem: & componendo conuertendo
 7. quinti. que solidum ab gh, hoc est solidum a b c d ipsi æquale, ad
 solidum a b e f, ut altitudo solidi a b c d ad solidi a b e f al-
 titudinem.

Sint solida parallelepipeda a b, c d in æqualibus basibus
 constituta: sitq; b e altitudo solidi a b : & solidi c d altitudo
 d f; que quidem major sit, quam b e. Dico solidum a b ad
 solidum c d eandem habere proportionem, quam b e ad
 d f, absindatur enim à linea d f æquals ipsi b e, que fit g f:
 & per g ducatur planum secans solidum c d; quod basibus
 31. unde
 cimi
 æquidistet, faciatq; sectionē h K. erunt solidia a b, c k æque
 alta inter
 se æqualia
 cuæqua-
 les bases
 habeant.

18. huius Sed solidū h d ad solidū
 dum c k
 est, ut alti-
 tudo d g
 ad g f alti-
 tudinem; se-
 catum sim solidum c d plano basi
 bus æquidistantē: & rursus cōpo-
 nendo, conuertendoq; solidū c k
 ad solidum c d, ut g f ad fd. ergo
 solidum a b, quod est æquale ipsi
 c k ad solidum c d eam propor-
 tionem habet, quam altitudo g f, hoc
 est b e ad d f altitudinem.

Sint deinde solida parallelepipe-
 da a b, a c in eadem basi; quorum
 axes d e, se cum ipsa æquales angu-





los contineant. Dicō solidum ab ad solidum ac eādem habere proportionem, quam axis de ad axem ef. Si enim axes in eadem recta linea fuerint constituti, hæc duo solidæ, in unum, atque idem solidum conuenient. quare ex iis, quæ proxime tradita sunt, habebit solidum ab ad solidum ac eandem proportionem, quam axis de ad ef axem. Si uero axes non sint in eadem recta linea, demittantur a punctis d, f perpendiculares ad basis planum, dg, fh; & iungantur eg, eh. Quoniam igitur axes cum basibus æquales angulos continent, erit deg angulus æqualis angulo feh: & sunt

anguli ad g h re-
cti, quare & re-
liquus edg æqua-
lis erit reliquo
efh: & triangulum deg triangu-
lo feh simile. er-
go gd ad de est,
ut hf ad fe: & per
mutando gd ad
hf, ut de ad ef.

Sed solidum ab
ad solidum ac
eandem propor-
tionem habet,
quam dg altitu-
do ad altitudinem
fh. ergo & ean-
dē habebit, quā
axis de a l ē faxē

Postremo sint
solidæ parallelepi-
peda ab, cd in



F E D . C O M M A N D I N I

æqualibus basibus, quorum axes cum basibus æquales angulos faciant. Dico solidum ab adsolidū cd ita esse, ut axis ef ad axem gh: nam si axes ad planum basis recti sint, illud perspicue constat: quoniam eadem linea, & axem & solidi altitudinem determinabit. Si vero sint inclinati, à punctis eg ad subiectum planum perpendicularares ducantur ek, gl: & iungantur fk, hl. rursus quoniam axes cum basibus æquales faciunt angulos, eodem modo demonstrabitur, triangulum efK triangulo gh l simile esse: & ex ad gl, ut ef ad gh. Solidum autem ab ad solidum cd est, ut eK ad gl. ergo & ut axis ef ad axem gh. quæ omnia demonstrare oportebat.

Ex iis quæ demonstrata sunt, facile constare potest, prismata omnia & pyramidæ, quæ triangulares bases habent, siue in eisdem, siue in æquilibus basibus constituantur, eandem proportionem habere, quam altitudines: & si axes cum basibus æquales angulos contineant, similiter eandem, quam axes, habere proportionem: sunt enim solida parallelepipedæ prismatum triangulares bases habentiū dupla; & pyramidum sextupla.

15. quinti
28. undecimi.
7. duodecimi.

THEOREMA XVI. PROPOSITIO XX.

Prismata omnia & pyramidæ, quæ in eisdem, vel æqualibus basibus constituuntur, eam inter se proportionem habent, quam altitudines: & si axes cum basibus faciant angulos æquales, eam etiam, quam axes habent proportionem.

Sint


Sint duo prismata a e, a f, quorum eadem basis quadrilatera a b c d: sitq; prismatis a e altitudo e g; & prismatis a f altitudo f h. Dico prisma a e ad prisma a f eam habere proportionem, quam e g ad f h. iungatur enim a e: & in unoquoque prisme duo prismata intelligantur, quorum bases sint triangula a b c, a c d. habeant duo prismata in eadem basi a b c constituta, proportionem eadem, quam ipsorum altitudines e g, f h, ex iam demonstratis, & similiter alia duo, quae sunt in basi a c d. quare totum prisma a e ad prisma a f eandem proportionem habebit, quam altitudo e g ad f h altitudinem.

Quod cum prismata sint pyramidum tripla, & ipsae pyramides, quarum eadem est basis quadrilatera, & altitudo prismatum altitudini æqualis, eam inter se proportionem habebunt, quam altitudines,

Si uero prismata bases æquales habeant, nō eisdem, sint duo eiusmodi prismata a e, f l: & sit basis prismatis a e quadrilaterum a b c d; & prismatis f l quadrilaterum f g h k. Dico prisma a e ad prisma f l ita esse, ut altitudo illius ad huius altitudinem. nam si altitudo sit eadem, intelligatur duæ pyramides a b c d e, f g h k l. quæ iter se æquales erūt, cum æquales bases, & altitudinem eandem habeant. quare & prismata a e, f l, quæ sunt harū pyramidum tripla, æqualia sint necesse est. ex quibus perspicue constat propositū. Si uero altitudo prismatis f l sit maior, à prisme f l absindatur prisma f m, quod æque altum sit, atq; ipsum a e.



G

6. duode
cimi
15. quinti





FED. COMMANDINI

erunt eadem ratione prismata a e, f m inter se æqualia. quare si similiter demonstrabitur prisma f m ad prisma f l eandem habere proportionem, quam prisnatis f m altitudo ad altitudinem ipsius f l. ergo & prisma a e ad prisma f l eandem proportionem habebit, quam altitudo ad altitudinem. sequitur, igitur ut & pyramides, quæ in æqualibus basibus constituuntur, eandem inter se se, quam altitudines, proportionem habeant.



Sint deinde prismata a e, a f in eadem basi a b c d; quorum axes cum basibus æquales angulos contineant; & sit prisma

matis a e axis gh; & prismatis a f axis lh. Dico prisma a e ad prismata a f eam proportionem habere, quam gh ad lh. ducantur à punctis g l perpendiculares ad basis planum g K, lm: & iungantur k h, h m. Itaque quoniam anguli g h k, lh m sunt æquales, similiter ut supra demonstrabimus, triangula gh K, lh m similia esse; & ut g K ad lm, ita gh ad lh. habet autem prisma a e ad prisma a f eandem proportionem, quam altitudo g K ad altitudinem lm, sicuti demonstratum est. ergo & eandem habebit, quam gh, ad lh. pyramidis igitur abcdg ad pyramidem abcde tandem proportionem habebit, quam axis gh ad lh axem.




Denique sint prismata a e, k o in æqualibus basibus ab cd, kl mn constituta; quorum axes cum basibus æquales faciant angulos: sitq; prismatis a e axis fg, & altitudo fh: prismatis autem k o axis pq, & altitudo pr. Dico prisma a e ad prisma k o ita esse, ut fg ad pq. iunctis enim gh,

FED. COMMANDINI

qr, eodem, quo supra, modo ostendemus: $f\ g$ ad $p\ q$, ut $f\ h$
 ad $p\ r$. sed prisma $a\ e$ ad ipsum $\kappa\ o$ est, ut $f\ h$ ad $p\ r$. ergo
 & ut $f\ g$ axis ad axem $p\ q$. ex quibus sic, ut pyramis $a\ b\ c\ d\ f$
 ad pyramidem $k\ l\ m\ n\ p$.
 eandem habet proportionem, quam axis ad
 axem. quod demonstrandum fuerat.

Simili ra-
 tione in a-
 liis prisma-
 tibus & py-
 ramidibus eadem demonstrabuntur.




THEOREMA XVII. PROPOSITIO XXI.

Prismata omnia, & pyramides inter se propor-
 tionem habent compositam ex proportione ba-
 sis, & proportione altitudinum.

Sint duo prismata $a\ e, g\ m$: sitque prismatis $a\ e$ basis qua-
 drilaterum $a\ b\ c\ d$, & altitudo $e\ f$: prismatis uero $g\ m$ ba-
 sis quadrilaterum $g\ h\ k\ l$, & altitudo $m\ n$. Dico prisma $a\ e$
 ad prisma $g\ m$ proportionem habere compositam ex pro-
 portione basis $a\ b\ c\ d$ ad basim $g\ h\ k\ l$, & ex proporzione
 altitudinis $e\ f$, ad altitudinem $m\ n$.

Sint enim primum $e\ f, m\ n$ aequales: & ut basis $a\ b\ c\ d$
 ad basim $g\ h\ k\ l$, ita fiat linea, in qua o ad lineam, in qua p :
 ut autem $e\ f$ ad $m\ n$, ita linea p ad lineam q . erunt lineae
 $p\ q$ inter se aequales. Itaque prisma $a\ e$ ad prisma $g\ m$ ea-
 pro

proportionem habet, quam basis $a b c d$ ad basim $g h k l$: si enim intelligantur duæ pyramides $a b c d e$, $g h k l m$, habebunt hæ inter se proportionem eandem, quam ipsarum bases ex sexta duodecimi elementorum. Sed ut basis $a b c d$ ad $g h k l$ basim, Ita linea o ad lineam p ; hoc est ad lineam q ei æqualem. ergo prisma $a e$ ad prisma $g m$ est, ut linea o ad lineam q . proportio autem o ad q cōposita est ex proportione o ad p , & ex proportione p ad q . quare prisma $a e$ ad prisma $g m$, & idcirco pyramis $a b c d e$, ad pyramidem $g h k l m$ proportionem habet ex eisdem proportionibus compositam, uidelicet ex proportione basis $a b c d$ ad basim $g h k l$, & ex proportione altitudinis $e f$ ad $m n$ altitudinem. Quod si lineæ $e f$, $m n$ inæquales ponantur, sit $e f$ minor: & ut $e f$ ad $m n$, ita fiat linea p ad lineam u : de-




inde ab ipsa $m n$ absindatur $r n$ æqualis $e f$: & per r reducat planum, quod oppositis planis æquidistant faciat sectionem s t. erit prisma $a e$, ad prisma $g t$, ut basis $a b c d$ ad basim $g h k l$; hoc est ut o ad p : ut autem prisma $g t$ ad prisma $g m$, ita altitudo $r n$; hoc est $e f$ ad altitudinem $m n$; uidelicet linea p ad lineam u . ergo ex æquali prisma $a e$ ad prisma $g m$ est, ut linea o ad ipsam u . Sed proportio o ad u cōposita est ex proportione o ad p , quæ est basis $a b c d$ ad basim $g h k l$; & ex proportione p ad u , quæ est altitudinis $e f$ ad altitudinem $m n$. prisma igitur $a e$ ad prisma $g m$

20. huius

FED. COMMANDINI

compositam proportionem habet ex proportione basiū,
& proportione altitudinum. Quare & pyramis, cuius ba-
sis est quadrilaterum a b c d, & altitudo e f ad pyramidem,



cuius basis quadrilaterum g h K l, & altitudo m n, compo-
sitam habet proportionem ex proportione basium a b c d,
g h k l, & ex proportione altitudinum e f, m n . quod qui-
dem demonstrasse oportebat.

E x iam demonstratis perspicuum est, prisma
ta omnia, & pyramides , in quibus axes cum basi-
bus æquales angulos continent , proportionem
habere compositam ex basium proportione , &
proportione axium . demonstratum est enim , a-
xes inter se eandem proportionem habere, quam
ipsæ altitudines.

THEOREMA XVIII. PROPOSITIO XXII.

Cvivslibet pyramidis, & cuiuslibet coni,
uel


uel coni portionis axis à centro gravitatis ita diuiditur, ut pars, quæ terminatur ad uerticem reliqua partis, quæ ad basim, sit tripla.

Sit pyramis, cuius basis triangulum ab c; axis d e; & gravitatis centrum k. Dico lineam d k ipsius K e triplam esse. trianguli enim b d c centrum gravitatis sit punctum f; trianguli a d c centrū g; & trianguli a d b sit h; & iungantur a f, b g, c h. Quoniam igitur centrū gravitatis pyramidis in axe consistit: suntq; d e, a f, b g, c h eiusdē pyramidis axes: conuenient omnes in idē punctū k, quod est gravitatis centrum. Itaque animo concipiamus hanc pyramidem diuisam in quatuor pyramidēs, quarum bases sint ipsa pyramidis triangula; & axis punctum uerteret
ctum k quæ quidem pyramidēs inter se æquales sunt, ut demonstrabitur. Ducatur enī per lineas d c, d e planum secās, ut sit ipsius, & basis a b c cōmunis sectio recta linea c e l: eiusdē uero & trianguli a d b sit linea d h l. erit linea a l æqualis ipsi l b: nam centrum gravitatis trianguli consistit in linea, quæ ab angulo ad dimidiam basim perducitur, ex tertia decima Archimedis. quare triangulum a c l æquale est triangulo b c l: & propterea pyramidis, cuius basis triangulum a c l, uerteret d, est æqualis pyramidī, cuius basis b c l triangulum, & idem uerteret. pyramidēs enim, quæ ab codē

17. huius

I. sexti.

5. duodecimi.





F E D. C O M M A N D I N I

sunt uertice, eandem proportionem habent, quam ipsarū bases. eādem ratione pyramis $a c l k$ pyramidī $b c l k$ & pyramis $a d l k$ ipsi $b d l k$ pyramidī æqualis erit. Itaque si a pyramidē $a c l d$ auferantur pyramidēs $a c l k$, $a d l k$: & à pyramidē $b c l d$ auferātur pyramidēs $b c l k$, $d b l k$: quæ relinquentur erunt æqualia. æqualis igitur est pyramidis $a c d k$ pyramidī $b c d k$. Rursus si per lineas $a d$, $d e$ ducatur planum quod pyramidem fecerit: sitq; eius & basis communis sectio $a e m$: similiter ostendetur pyramidis $a b d k$ æqualis pyramidī $a c d k$. ducto denique alio piano per lineas $c a$, $a f$: ut eius, & trianguli $c d b$ communis sectio sit $c f n$, pyramidis $a b c k$ pyramidī $a c d k$ æqualis demonstrabitur. cū ergo tres pyramidēs $b c d k$, $a b d k$, $a b c k$ uni, & eidem pyramidī $a c d k$ sint æquales, omnes inter se se æquales erūt. Sed ut pyramidis $a b c d$ ad pyramidēm $a b c k$, ita $d e$ axis ad axem $k e$, ex uigesima propositione huius: sunt enim hæ pyramidēs in eadem basi, & axes cum basibus æquales continent angulos, quòd in eadem recta linea constituuntur. quare diuidendo, ut tres pyramidēs $a c d k$, $b c d k$, $a b d k$ ad pyramidēm $a b c k$, ita $d k$ ad $k e$. constat igitur lineam $d K$ ipsius $K e$ triplam esse. sed & $a k$ tripla est $K f$: itemque $b K$ ipsius $K g$: & $c k$ ipsius $x l$ tripla. quod eodem modo demonstrabimus.

Sit pyramidis, cuius basis quadrilaterum $a b c d$; axis $e f$: & diuidatur $e f i n g$, ita ut $e g$ ipsius $g f$ sit tripla. Dico centrum gravitatis pyramidis esse punctum g . ducatur enim linea $b d$ diuidens basim in duo triangula $a b d$, $b c d$: ex quibus intelligatur cōstituti duæ pyramidēs $a b d e$, $b c d e$: sitque pyramidis $a b d e$ axis $e h$; & pyramidis $b c d e$ axis $e K$: & iungatur $h K$, quæ per f transibit: est enim in ipsa $h K$ centrum gravitatis magnitudinis compositæ ex triangulis $a b d$, $b c d$, hoc est ipsius quadrilateri. Itaque centrum gravitatis pyramidis $a b d e$ sit punctum l : & pyramidis $b c d e$ sit m . ducta igitur $l m$ ipsi $h m$ linea æquidistantib: nam $e l$ ad

Hic eandem habet proportionem, quam $e:m \text{ ad } k$, uidelicet triplam. quare linea $l:m$ ipsam $e:f$ secabit in punto g : etenim $e:g \text{ ad } g:f$ est, ut $e:l \text{ ad } l:h$. præterea quoniam $h:k$, $l:m$ æquidistant, erunt triangula $h:e:f$, $l:g:m$ similia: itemq; inter se similia $e:k$, $g:m$: & ut $e:f$ ad $g:m$, ita $h:f$ ad $l:g$: & ita $f:k$ ad $g:m$. ergo ut $h:f$ ad $l:g$, ita $f:k$ ad $g:m$: & permutando ut $h:f$ ad $f:k$, ita $l:g$ ad $g:m$. sed cum h sit centrum trianguli $a:b:d$; & k trianguli $b:c:d$: punctum f totius quadrilateri $a:b:c:d$: centrum: erit ex 8. Archimedis de centro gravitatis planorum $h:f$ ad $f:k$, ut triangulum $b:c:d$ ad triangulum $a:b:d$: ut autem $b:c:d$ triangulum ad triangulum $a:b:d$, ita pyramidis $b:c:d:e$ ad pyramidem $a:b:c:d:f$. ergo linea $l:g$ ad $g:m$ erit, ut pyramidis $b:c:d:e$ ad pyramidem $a:b:c:d$. ex quo sequitur, ut totius pyramidis $a:b:c:d:e$ punctum g sit gravitatis centrum. Rursus sit pyramidis basim habens pentagonum $a:b:c:d:e$; & axem $f:g$: dividaturq; axis in punto h , ita ut sh ad hg triplam habeat proportionem. Dico h gravitatis centrum esse pyramidis $a:b:c:d:f$. iungatur enim $e:b$: intelligaturq; pyramidis, cuius vertex f , & basis triangulum $a:b:c$: & alia pyramidis intelligatur euædem verticem habens, & basim $b:c:d:e$ quadrilaterum: sit autem pyramidis $a:b:c:d:f$ axis $f:k$, & gravitatis centrum l : & pyramidis $b:c:d:e$ axis $f:m$, & centrum gravitatis m : intelligaturq; $x:m$, $l:n$, quæ per puncta $g:h$ transibunt. Rursus eodem modo, quo supra, demonstrabimus lineas $K:g:m$, $l:h:n$ sibi ipsius æquidistantes.




H

FED. COMMANDINI

& denique punctum h pyramidis abcdef grauitatis esse centrum, & ita in aliis.

Sit conus, uel coni portio axem habens b d: seceturque planus per axem, quod sectionem faciat triangulum abc: & b'd axis diuidatur in e, ita ut be ipsius ed sit tripla. Dico punctum e. coni, uel coni portionis, grauitatis esse centrum. Si enim fieri potest, sit centrum f: & producatur ef extra figuram in g. quam uero proportionem habet ge ad ef, habeat basis coni, uel coni portionis, hoc est circulus, uel ellipsis circa diametrum ac ad aliud spaciū, in quo h. Itaque in circulo, uel ellipsi plane describatur rectilinea figura aklmnop, ita ut quæ relinquuntur portiones sint minores spacio h: & intelligatur pyramidis basim habens rectilineam figuram aklmnop, & axem b'd; cuius quidem grauitatis centrum erit punctum e, ut iam demonstrauimus. Et quoniam portiones sunt minores spacio h, circulus, uel ellipsis ad portiones ma-



orem proportionem habet, quam ge ad ef. sed ut circulus, uel ellipsis ad figuram rectilineam fibi inscriptam, ita conus, uel coni portio ad pyramidem, quæ figuram rectilineam pro basi habet; & altitudinem æqualem: etenim su-

pra

prademonstratum est, ita esse cylindrum, uel cylindri portionem ad prisma, cuius basis rectilinea figura, & aquila altitudo. ergo per conuersionem rationis, ut circulus, uel ellipsis ad portiones, ita conus, uel coni portio ad portiones solidas. quare conus uel coni portio ad portiones solidas maiorem habet proportionem, quam g e ad e f: & diuidendo, pyramis ad portiones solidas maiorem proportionem habet, quam g f ad f e. fiat igitur q f ad f e ut pyramis ad dictas portiones. Itaque quoniam a cono uel coni portione, cuius grauitatis centrum est f, auferatur pyramis, cuius centrum e; reliqua magnitudinis, quae ex solidis portionibus constat, centrum grauitatis erit in linea e f protracta, & in punto q. quod fieri non potest: est enim centrum grauitatis intra. Constat igitur coni, uel coni portionis grauitatis centrum esse punctum e. que omnia demonstrare oportebat.

THEOREMA XIX. PROPOSITIO XXIII.

Q VOD LIBET frustum à pyramide, quæ triangularem basim habeat, abscissum, diuiditur in tres pyramides proportionales, in ea proportione, quæ est lateris maioris basis ad latus minoris ipsi respondens.

Hoc demonstrauit Leonardus Pisanus in libro, qui de praxi geometriæ inscribitur. Sed quoniam is adhuc impressus non est, nos ipsius demonstrationem breuiter perstringemus, rem ipsam secuti, non uerba. Sit frustum pyramidis a b c d e f, cuius maior basis triangulum a b o, minor d e f: & iunctis a e, e c, c d, per lineas a e, e c, ducatur planum secans frustum: itemque per lineas e c, c d; & per c d, d a alia plana ducantur, quæ diuident frustum in tres pyramides a b c e, a d c e, d e f c.

FED. COMMANDINI

Dico eas proportionales esse in proportione, quæ est lateris ab ad latus de , ita & earum maior sit abc , media $ad ce$, & minor $defc$. Quoniam enim linea de , ab æquidistant; & inter ipsas sunt triangula abe , ade ;

i. secuti. erit triangulum abe

ad triangulum $ad e$,

ut linea ab ad lineam

de . ut autem triangu-

lum abe ad triangu-

lum $ad e$, ita pyramis

abc ad pyramidem

$ad ec$: habent enim

altitudinem eandem,

quaæ est à puncto c ad

planum, in quo qua-

drilaterum $abed$. er-

go ut ab ad de , ita pyramis abc ad pyramidem $ad ec$.

Rursus quoniam æquidistantes sunt ac , df ; erit eadem

ratione pyramis $ad ce$ ad pyramidem $cdef$, ut ac ad

df . Sed ut ac ad df , ita ab ad de , quoniam triangula

abc , def similia sunt, ex nona huius. quare ut pyramis


abc ad pyramidem $ad ce$, ita pyramis $ad ce$ ad ipsam

$defc$. frustum igitur abc $cdef$ dividitur in tres pyramides

proportionales in ea proportione, quæ est lateris ab ad de

latus, & earum maior est cab , media $ad ce$, & minor

$defc$. quod demonstrare oportebat.




PROBLEMA V. PROPOSITIO XXIIIL

Q UOD LIBET frustum pyramidis, vel coni,
vel coni portionis, plano basi æquidistanti ita se-
care, ut sectio sit proportionalis inter maiorem,
& minorem basim.

Sit

SIT frustum pyramidis a e, cuius maior basis triangulum a b c, minor d e f; & oporteat ipsum platio, quod basi equidistet ita secare, ut secio sit proportionalis inter triangula a b c, d e f. Inueniatur inter lineas a b, d e media proportionalis, que sit b g: & a punto g erigatur gh æquidistantis b e, secansq; ad in h; deinde per h ducatur planum basibus æquidistantis, cuius secio sit triangulum h k l. Dico triangulum h k l proportionale esse inter triangula a b c, d e f, hoc est triangulum a b c ad triangulum h k l eandem habere proportionem, quam triangulum h k l ad ipsum d e f. Quoniam enim lineæ a b, h k æquidistantium planorum sectiones inter se æquidistant: atque æquidistant b k, g h: linea h k ipsum g b est æqualis: & propterea proportionalis inter a b, d e. quare ut a b ad h k, ita est h k ad d e. fiat ut h k ad d e, ita d e ad aliam lineam, in qua sit m. erit ex æquali ut a b ad d e, ita h k ad m. Et quoniam triangula a b c, h k l, d e f similia sunt; triangulum a b c ad triangulum h k l est, ut linea a b ad lineam d e: triangulum autem h k l ad ipsum d e f est, ut h k ad m. ergo triangulum a b c ad triangulum h k l eandem proportionem habet, quam triangulum h k l ad ipsum d e f. Eodem modo in aliis frustis pyramidis idem demonstrabitur.

Sit frustum coni, vel coni portionis a d: & secetur plane per axem, cuius secio sit a b c d. ita ut maior ipsius basis sit circulus, vel ellipsis circa diametrum a b; minor circa c d. Rursus inter lineas a b, c d inueniatur proportionalis b e: & ab e ducta e f æquidistanti b d, quæ lineam c a in f secet,

16. unde
eant


34. primi

9. huius
corol.
20. sexti

11. quinti

F E D. C O M M A N D I N I

per f planum basibus æquidistantes ducatur, ut sit sectio circulus, uel ellipsis circa diametrum f g. Dico sectionem a b ad sectionem f g eandem proportionem habere, quam f g ad ipsam c d. Simili enim ratione, qua supra, demonstrabitur quadratum a b ad quadratum f g ita esse, ut quadratum f g ad c d quadratum. Sed circuli inter se eandem proportionem habent, quam diametrorum quadrata. Ellipses autem circa a b, f g; c d, quæ similes sunt, ut ostendimus in commentariis in principium libri Archimedis de conoidibus, & sphaeroidibus, eam habent proportionem, quam quadrata diametrorum, quæ eiusdem rationis sunt, ex corollario septima propositionis eiusdem libri. Ellipses enim nunc appello ipsa spacia ellipsis contenta. ergo circulus, uel ellipsis a b ad circulum, uel ellipsem f g eam proportionem habet, quam circulus, uel ellipsis f g ad circulum uel ellipsem c d. quod quidem faciendum propositum.





THEOREMA XX. PROPOSITIO XXV.

QUOD LIBET frustum pyramidis, uel coni, uel coni portionis ad pyramidem, uel conum, uel coni portionem, cuius basis eadem est, & æqualis altitudo, eandem proportionem habet, quam utræque bases, maior, & minor simul sumptæ vñâ cù ea, quæ inter ipsas sit proportionalis, ad basim maiorem.

Sic

SIT frustum pyramidis, uel coni, uel coni portionis ad, cuius maior basis a b, minor c d. & secetur altero plano basi æquidistante, ita ut se^tio e f sit proportionalis inter bases a b, c d. constituatur autem pyramidis, uel conius, uel coni portio a g b, cuius basis sit eadem, quæ basis maior frusti, & altitudo æqualis. Dico frustum a d ad pyramidem, uel conum, uel coni portionem a g b eandem proportionem habere, quæ utræque bases, a b, c d unam cum e f ad basim a b. est enim frustum a d æquale pyramidi, uel cono, uel coni portioni, cuius basis ex tribus basibus a b, e f, c d constat; & altitudo ipsius altitudini est æqualis: quod mox ostendemus. Sed pyramides, coni, uel coni portiones, quæ sunt æquali altitudine, eadem inter se, quam bases, proportionem habent, sicuti demonstratum est, partim ab Euclide in duodecimo libro elementorum, partim à nobis in commentariis in undecimam propositionem Archimedis de conoidibus, & sphæroidibus. quare pyramidis, uel conus, uel coni portionis, cuius basis est tribus illis basibus æqualis ad a g b eam habet proportionem, quam bases a b, e f, c d ad a b basim. Frustum igitur ad ad a g b.



F E D . C O M M A N D I N I


pyramideni, uel conum, uel coni portionem candem proportionem habet, quam bases ab, cd unà cum e f ad basim ab. quod demonstrare uolebamus.

Frustum uero ad æquale esse pyramidi, uel cono, uel coni portioni, cuius basis constat ex basibus ab, cd, ef, & altitudo frusti altitudini est æqualis, hoc modo ostendemus.

Sit frustum pyramidis abcdef, cuius maior basis triangulum abc; minor def: & secetur piano basibus æquidistante, quod sectionem faciat triangulum ghk inter triangula abc, def proportionale. Iam ex iis, quæ demonstrata sunt in 23. huius, patet frustum abcdef dividiri in tres pyramidæ proportionales; & earum maiorem esse pyramidem abcd minorē uero defb. ergo pyramidis à triangulo ghk constituta, quæ altitudinem habeat frusti altitudini æqualem, proportionalis est inter pyramidæ abcd, defb: & idcirco frustum abcdef tribus dictis pyramidibus æquale erit. Itaque si intelligatur alia pyramidis æque alta, quæ basim habeat ex tribus basibus abc, def, ghk constantem; perspicuum est ipsam eidem pyramidibus, & propterea ipsi frusti æqualem esse.


Rursus sit frustum pyramidis ag, cuius maior basis quadrilaterum abcd, minor efg h: & secetur piano basibus æquidistante, ita ut fiat sectio quadrilaterum klmn, quod sit proportionale inter quadrilatera abcd, efg h. Dico pyramidem, cuius basis sit æqualis tribus quadrilateris abcd, klmn, efg h, & altitudo æqualis altitudini frusti; ipsi frusti ag æquali est.

Dicatur enim planum per lineas fb, hd, quo



quod dividat frustum in duo frusta triangulares bases habentia, uidelicet in frustum ab def h, & in frustum b c d f g h. erit triangulum & in proportionale inter triangula abd, e f h: & triangulum b m n in proportionale inter b c d, f g h. sed pyramis aequa alta, cuius basis constat ex tribus triangulis abd, k l m, e f h, demonstrata est frusto ab def h aequalis: & similiter pyramis, cuius basis constat ex triangulis b c d, l m n, f g h aequalis frusto b c d f g h: componuntur autem tria quadrilatera abcd, k l m n, e f g h ex sex triangulis iam dictis. pyramis igitur basim habens aequalem tribus quadrilateris, & altitudinem eandem ipsi frusto a g est aequalis. Eodem modo illud demonstrabitur in aliis eiusmodi frustis.

Sit frustum coni, uel coni portionis ad; cuius maior basis circulus, uel ellipsis circa diametrum ab; minor circa c d: & secetur piano, quod basibus aequaliter faciatq; sectionem circulum, uel ellipsim circa diametrum ef, ita ut inter circulos, uel ellipses ab, cd sit proportionalis. Dico conum, uel coni portionem, cuius basis est aequalis tribus circulis, uel tribus ellipsis ab, ef, cd; & altitudo eadem, qua frusti ad, ipsi frusto aequalem esse. producatur enim frusti superficies quoque coeat in unum punctum, quod sit g: & coni, uel coni portionis agb axis sit gh, occurrentis planis ab, ef, cd in punctis h k l: circa circulum vero describatur quadratum munop, & circa ellipsum rectangularum m n o p, quod ex ipsis diametris constat: iunctisq; gm, gn, go, gp, ex eodem uertice intelligatur pyramis basim habens dictum quadratum, uel rectangularum: & plana in quibus sunt circuli, uel ellipses ef, cd usque ad eius latera




FEDICOMMANDINI

9 huius

2. duodecimi.

7. de co-
noidibus
& sphæ-
roidibus

-prodicantur. Quoniam igitur pyramis secatur planis basi
æquidistantibus, sectiones similes erunt: atque erunt qua-
drata, uel rectangula circa circulos, uel ellipses descripta,
quemadmodum & in ipsa basi. Sed cum circuli inter se ea
proportionem habeant, quam diametrorum quadrata:
itemq; ellipses eam quam rectangula ex ipsarum diametris
constantia: & sit circulus, uel ellipsis circa diametrum e f



proportionalis inter circulos, uel ellipses a b, c d; erit re-
ctangulum e f etiam inter rectangula a b, c d. proporcio-
nale: per rectangulum enim nunc breuitatis causa etiā ip-
sum quadratum intelligemus. quare ex iis, quæ proxime
dicta sunt, pyramis basim habens æqualem dictis rectangu-
lis, & altitudinem eandem, quam frustum a d, ipsi frusto à
pyramide abspresso æqualis probabitur. ut autem rectangu-
lum c d ad rectangulum e f, ita circulus, uel ellipsis c d ad e f
circulum, uel ellipsem: componendoq; ut rectangula c d,
e f, ad e f rectangulum, ita circuli, uel ellipses e d, e f, ad e f:
& ut rectangulum e f ad rectangulum a b, ita circulus, uel
ellipsis e f ad a b circulum, uel ellipsem. ergo ex æuali, &
componendo, ut rectangula c d, e f, a b ad ipsum a b, ita cir-
culi,

cali, uel ellipses c d, e f a b ad circulum, uel ellipsis a b. Intelligatur pyramis q basim habens aequalem tribus rectangulis a b, e f, c d; & altitudinem eadem, quam frustum a d. intelligatur etiam conus, uel coni portio q, eadem altitudo, cuius basis sit tribus circulis, uel tribus ellipsis a b, e f, c d aequalis. postremo intelligatur pyramis a l b., cuius basis sit rectangle m n o p, & altitudo eadem, quæ frusti: itemq, intelligatur conus, uel coni portio a l b., cuius basis circulus, uel ellipsis circa diametrum a b, & eadem altitudo. ut igitur rectangle a b; e f, c d ad rectangle a b, ita pyramis q ad pyramidem a l b.; & ut circuli, uel ellipses a b, e f, c d ad a b circulum, uel ellipsis, ita conus, uel coni portio q ad conum, uel coni portionem a l b. conus igitur, uel coni portio q ad conum, uel coni portionem a l b est, ut pyramis q ad pyramidem a l b. sed pyramis a l b ad pyramidem a g b est, ut altitudo ad altitudinem, ex 20. huius: & ita est conus, uel coni portio a l b ad conum, uel coni portionem a g b ex 14. duodecimi elementorum, & ex iis, quæ nos demonstrauimus in commentariis in undecimam de conoidibus, & sphæroidibus, propositione quarta. pyramis autem a g b ad pyramidem c g d proportionem habet compositam ex proportione basium & proportione altitudinum, ex uigesima prima huius: & simili- ter conus, uel coni portio a g b ad conum, uel coni portionem c g d proportionem habet compositam ex eisdem proportionibus, per ea, quæ in dictis commentariis demon- strauimus, propositione quinta, & sexta: altitudo enim in utrisque eadem est, & bases inter se se eandem habent proportionem. ergo ut pyramis a g b ad pyramidem c g d, ita est conus, uel coni portio a g b ad a g d conum, uel coni portionem: & per conversionem rationis, ut pyramis a g b ad frustum a pyramide abscissum, ita conus uel coni portio a g b ad frustum a d. ex aequali igitur, ut pyramis q ad frustum a pyramide abscissum, ita conus uel coni portio q ad

6. 11. duo
decimi

F E D . C O M M A N D I N I

frustum a d. Sed pyramis q̄ æqualis est frusto à pyramidē absciso, ut demonstravimus, ergo & conus, uel coni portio q, cuius basis ex tribus circulis, uel ellipsisib⁹ a, b, e f, c d. constat, & altitudo eadē, quæ frusti ipsi frusto ad est æqualis. atque illud est, quod demonstrare oportebat.

T H E O R E M A X X I . P R O P O S I T I O X X V I .



C V I V S T I B E T frusti à pyramide, uel cono, uel coni portione abscissi, centrum grauitatis est in axe, ita ut eo primum in duas portiones diuiso, portio superior, quæ minorem basim attingit ad portionem reliquam eam habeat proportionem, quam duplum lateris, uel diametri maioris basis, vñā cum latere, uel diametro minoris, ipsi respondentē, habet ad duplum lateris, uel diametri minoris basis vñā cū latere, uel diametro maioris: deinde à puncto diuisionis quarta parte superioris portionis in ipsa sumpta: & rursus ab inferioris portionis termino, qui est ad basim maiorem, sumpta quarta parte totius axis: centrum sit in linea, quæ his finibus continetur, atque in eo linea puncto, quo sic diuiditur, ut tota linea ad partem propinquiorem minori basi, eadem proportionem habeat, quam frustum ad pyramidē, uel conum, uel coni portionem; cuius basis sit eadem, quæ basis maior, & altitudo frusti altitudini æqualis.

sic

Sit frustum a e à pyramidē, quæ triangularem basim habet abscissum; cuius maior basis triangulum a b c, minor d e f; & axis g h, ducto autem plano per axem & per linea d a, quod sectionem faciat d a l quadrilaterum; puncta K l lineas b c, e f bifariam secabunt. nam cum g h sit axis frusti; erit h centrum gravitatis trianguli a b c: & g centrum trianguli d e f: centrum uero cuiuslibet trianguli est in recta linea, quæ ab angulo ipsius ad diuiditā basim ducitur ex decimatertia primi libri Archimedis de cōtro gravitatis planorum. quare centrum gravitatis trapezii b c f e est in linea K l, quod sit m: & à puncto m ad axem ducta m n ipsis a k, uel d l æquidistante, erit axis g h diuisus in portiones g n, n h, quas diximus: eadem enim proportionem habet g n ad n h, quam l m ad m k. At l m ad m k habet eam, quam duplum lateris maioris basis b c una cum latere minoris e f ad duplum lateris e f unā cum latere b c, ex ultima eiusdem libri Archimedis. Itaque à linea n g abscindatur, quarta pars, quæ sit n p: & ab axe h g abscindatur itidem quarta pars h o: & quam proportionem habet frustum ad pyramidem, cuius maior basis est triangulum a b c, & altitudo ipsi æqualis; habeat o p ad p q. Dico centrum gravitatis frusti esse in linea p o, & in puncto q. namque ipsum esse in linea g h manifeste constat. protractis enim frusti pla-



3. diff. hu
ius.

Vltima e-
iusdē libri
Archime-
dis.



F E D . C O M M A N D I N I

nis, quo usque in unum punctum r conueniant; erit pyramidis a b c r; & pyramidis d e f r grauitatis centrum in linea r h. ergo & reliqua magnitudinis, uidelicet frusti centrum in eadem linea necessario comperietur. Iungantur d b, d c, d h, d m: & per lineas d b, d c duco altero piano intelligatur frustum in duas pyramides diuisum: in pyramidem quidem, cuius basis est triangulum a b c, uertex d: & in eam, cuius idem uertex, & basis trapezium b c f e. erit igitur pyramidis a b c d axis d h, & pyramidis b c f e d axis d m: atque erunt tres axes g h, d h, d m in eodem plano da K l. ducatur præterea per o linea s t ipsi a K æquidistantes, quæ lineam d h in u secet: per p uero ducatur x y æquidistantes eidem, secansque d m in z: & iungatur z u, quæ secet g h in φ. transibit ea per q: & erunt φ q unum, atque idem punctum; ut inferius apparet. Quoniam igitur linea u o æquidistanti ipsi d g, erit d u ad u h, ut g o ad o h. Sed g o tripla est o h, quare & d u ipsius u h est tripla: & ideo pyramidis a b c d centrum grauitatis crif punctum u. Rursus quoniam z y ipsi d l æquidistant, d z ad z m est, ut l y ad y m: estque l y ad y m, ut g p ad p n. ergo d z ad z m est, ut g p ad p n. Quodcum g p sit tripla p n; erit etiam d z ipsius z m tripla: atque ob eandem causam punctum z est centrum grauitatis pyramidis b c f e d. iungatur z u, in ea erit ceterum



gra-


gravitatis magnitudinis, quæ ex utrisque pyramidibus constat; hoc est ipsius frusti. Sed frusti centrum est etiam in axe g h. ergo in puncto φ, in quo lineæ z u, g h conueniunt. Itaque u z ad eam proportionem habet, quam pyramidis ^{8. primi libri Ar-}
 b c f e d ad pyramidem a b c d. & componendo u z ad z p ^{chimedis de cetero} eam habet, quam frustum ad pyramidem a b c d. Ut uero u z ad z p, ita o p ad p φ ob similitudinem triangulorum, ^{tis plano} grauitatis ^{runa} u o p, z p φ. quare o p ad p φ est ut frustum ad pyramidem, a b c d. sed ita erat o p ad p q. æquales igitur sunt p φ, p q: & ^{7. quinti.} q φ unum atque idem punctum. ex quibus sequitur lineam z u secare o p in q: & propterea punctum q ipsius frusti gravitatis centrum esse.

Sit frustum a g à pyramide, quæ quadrangularem basim habeat abscissum, cuius maior basis a b c d, minor e f g h, & axis k l. diuidatur autem primū k l, ita ut quam proportionem habet duplum lateris a b una cum latere e f ad duplum lateris e f una cum a b; habeat k m ad m l. deinde à puncto m ad k sumatur quarta pars ipsius m k, quæ sit m n. & rursus ab l sumatur quarta pars totius axis l k, quæ sit l o. postremo fiat o n ad n p, ut frustum a g ad pyramidem, cuius basis sit eadem, quæ frusti, & altitudo æqualis. Dico punctum p frusti a g gravitatis centrum esse. ducantur enim a c, e g: & intelligantur duo frusta triangulares bases habentia, quorum alterum l f ex basibus a b c, e f g cōstet; alterum l h ex basibus a c d, e g h. Sitq; frusti l f axis q r; in quo gravitatis centrum s: frusti uero l h axis t u, & x gravitatis centrum: deinde iungantur u r, t q, x s. transibit u r per l: quoniam l est centrum gravitatis quadranguli a b c d: & puncta r u gravitatis centra triangulorum a b c, a c d; in quæ quadrangulum ipsum diuiditur. eadein quoque ratione t q per punctum k transibit. At uero proportiones, ex quibus frustorum gravitatis centra inquirimus, eadem sunt in toto frusto a g, & in frustis l f, l h. Sunt enini per octuam huius quadrilatera a b c d, e f g h similia;

F E D . C O M M A N D I N I

itemq; similia triangula a b c, e f g: & a c d, e g h, idcircoq; latera sibi ipsis respondentia eandem inter se se proportionem seruant. Ut igitur duplum lateris a b una cum latere e f ad duplum lateris e f unam cum a b, ita est duplum a d lateris una cum latere e h ad duplum e h unam cum a d: & ita in aliis. Rursus frustum ag ad pyramidem, cuius eadem est basi, & æqualis altitudo eandem proportionē habet, quam frustū lf ad pyramidem, quæ est eadē basi, & æquali altitudine: & similiiter quam lh frustum ad pyramidem, quæ ex eadē basi, & æquali altitudine constat. Nam si inter ipsas bases medix proportionales constituantur, tres bases simul sumptæ ad maiorem basim in omnibus eodem modo se habebunt. Vnde fit, ut axes K1, q r, t u à punctis p s x in eandem proportionem secantur, ergo linea x s per p transibit: & lineæ r u, sx, qt inter se æquidistantes erunt. Itaque cum frusti ag latera producta

2. sexti.




ducta fuerint, ita ut in unum punctum y cocant, erunt tria galia uyl, xyp, tyk inter se similia: & similia etiam triangula l y r, p y s, k y q. quarē ut in 19 huius, demonstrabitur xp, ad ps: itemq; tk ad k q eandem habere proportionē, quam ul ad lr. Sed ut ul ad l, ita est triangulum abc ad triangulum acd: & ut tk ad Kq, ita triangulum efg ad triangulum egh. Vt autem triangulum abc ad triangulum acd, ita pyramis abcy ad pyramidem acdy. & ut triangulum efg ad triangulum egh, ita pyramis efgy ad pyramidem eghy; ergo ut pyramis abcy ad pyramidē acdy, ita pyramis efgy ad pyramidē eghy. reliquum 19. quinta
igitur frustū lf ad reliquum frustū lh est ut pyramis abcy
ad pyramidem acdy, hoc est ut ul ad lr, & ut xp ad ps.
Quod cum frusti lf centrum grauitatis sit s: & frusti lh sit
centrum x: constat punctum p totius frusti ag grauitatis
esse centrum. Eodem modo fiet demonstratio etiam in
aliis pyramidibus.

Sit frustum ad à cono, uel coni portione abscissum, cuius maior basis circulus, uel ellipsis circa diametrum ab; minor circa diametrum cd: & axis ef. diuidatur autē ef in g, ita ut eg ad gf eandem proportionem habeat, quam duplum diametri ab una cum diametro cd ad duplum cd una cum ab. Sitq; gh quarta pars lineaeg: & sit fk item quarta pars totius fe axis. Rursus quam proportionem habet frustum ad ad conum, uel coni portionem, in eadē basi, & æquali altitudine, habeat linea Kh ad hl. Dico punctum l frusti ad grauitatis centrum esse. Si enim fieri potest, sit in centrum: producaturq; lm extra frustum in n: & ut nl ad lm, ita fiat circulus, uel ellipsis circa diametrum ab ad aliud spaciū, in quo sit o. Itaque in circulo, uel ellipsi circa diametrum ab rectilinea figura plane describatur, ita ut quæ relinquuntur portiones sint o spacio minores: & intelligatur pyramis apb, basim habens rectilineam figuram in circulo, uel ellipsi ab descriptam: & qua

8. Archi-
medis.

FED. COMMANDINI

frustum pyramidis sit abscessum . erit ex iis quæ proxime tradidimus , frustu pyramidis ad centrum gravitatis l . Quo niam igitur portiones spacio o minores sunt ; habebit circulus , uel ellipsis a b ad portiones dictas majorē proportionem , quam n 1 ad l m . sed ut circulus , uel ellipsis a b ad portiones , ita a p b conus , uel coni portio ad solidas portiones , id quod supra demon stratum est : & ut circulus uel ellipsis c d ad portiones , quæ ipsi insunt , ita conus , uel coni portio c p d ad solidas ipsius portiones . Quod cum figuræ in circulis ; uel ellipsis a b c d descriptæ similes sint , erit proportio circuli , uel ellipsis a b ad suas portiones , eadē , quæ circuli uel ellipsis c d ad suas . ergo conus , uel coni portio a p b ad portiones solidas eadem habet proportionē , quam conus , uel coni portio c p d ad solidas ipsius portiones . reliquum igitur coni , uel coni portionis frustū , scilicet a d ad reliquias portiones solidas in ipso contentas eandem proportionē habet , quam conus , uel coni portio a p b ad solidas portiones : hoc est eandem , quam circulus , uel ellipsis a b ad portiones planas . quare frustum coni , uel coni portionis a d



19. quinti

ad

ad portiones solidas maiorem habet proportionem, quam
n l ad 1 m : & diuidendo frustum pyramidis ad dictas por-
tiones maiorem proportionem habet, quam n m ad m l,
fiat igitur ut frustum pyramidis ad portiones, ita q m ad
m l. Itaque quoniam à frusto coni, uel coni portionis a d,
cuius grauitatis centrum est m , auferatur frustum pyramidis
habens centrum l; erit reliqua magnitudinis, qua ex
portionibus solidis constat ; grauitatis ceterum in linea 1 m
producta, atque in puncto q, extra figuram posito : quod
fieri nullo modo potest. reliquit ergo, ut punctum l sit
frusti a d grauitatis centrum. qua omnia demonstranda
proponebantur.

THEOREMA XXII. PROPOSITIO XXVII

OMNIVM solidorum in sphæra descripto-
rum, quæ æqualibus, & similibus basibus conti-
nentur, centrum grauitatis est idem, quod sphæ-
ræ centrum .

Solida eiusmodi corpora regularia appellare solent, de-
quibus agitur in tribus ultimis libris elementorum : sunt
autem numero quinque, tetrahedrum, uel pyramis, hexa-
hedrum, uel cubus, octahedrum, dodecahedrum, & icosa-
hedrum .



Sit primo a b c d pyramis in sphæra descripta, cuius sphæ-
ræ centrum sit e. Dico e pyramidis a b c d grauitatis esse
centrum . Si enim iuncta d e producatur ad basim a b c in
f ex iis, quæ demonstrauit Campanus in quartodecimo li-
bro elementorum, propositione decima quinta, & decima
septima, erit f centrum circuli circa triangulum a b c de-
scripti : atque erit e f sexta pars ipsius sphæræ axis . quare
ex prima huius constat trianguli a b c grauitatis centrum
esse punctum f: & idcirco lineam d f esse pyramidis axem.

F E D : C O M M A N D I N I

At cum e f sit sexta pars axis sphæræ, crit d e tripla e f, ergo punctum e est grauitatis centrum ipsius pyramidis: quod in uigesima secunda huius demonstratum fuit. Sed e est centrum sphæræ. Sequitur igitur, ut centrum grauitatis pyramidis in sphæra descriptæ idem sit, quod ipsius sphæræ centrum.

Sit cubus in sphæra descriptus a b, & oppositorum planorum lateribus bifariam diuisis, per puncta diuisionum plana ducantur, ut communis ipsorum sectio sit rectilinea c d. Itaque si ducatur a b, solidi scilicet diameter, lineæ a b, c d ex trigesimali nona undecimi sese bifariam secabunt. secant autem in punto e. erit e centrum grauitatis solidi a b, id quod demonstratum est in octaua huius. Sed quoniam ab est sphæræ diametro æqualis, ut in decima quinta propositione tertii decimi libri elementorum ostenditur: punctum e sphæræ quoque centrum erit. Cubi igitur in sphæra descripti grauitatis centrum idem est, quod centrum ipsius sphæræ.


Sit octahedron a b c d e f, in sphæra descriptum, cuius sphæræ centrum sit g. Dico punctum g ipsius octahedri grauitatis centrum esse. Constat enim ex iis, quæ demonstrata sunt à Campano in quinto decimo libro elementorum, propositione sextadecima eiusmodi solidum diuidi in duas pyramides æquales, & similes; uidelicet in pyramidem,



DE CENTRO GRAVIT. SOLID. 39


dem, cuius basis est quadratum a b c d, & altitudo e g: & in pyramidem, cuius eadē basis, altitudoq; f g; ut sint e g, g f semidiametri sphæræ, & linea una. Cū igitur g sit sphæræ centrum, erit etiam centrum circuli, qui circa quadratū a b c d describitur: & propterea eiusdem quadrati grauitatis centrum: quod in prima propositione huius demonstratum est, quare pyramidis a b c d e axis erit e g: & pyramidis a b c d e, & pyramidis a b c d f centrum sit K: per spicuum est ex uigesima secunda propositione huius, linea e h triplam esse h g: cō ponendoq; e g ipsius g h quadruplam. & eade ratione f g quadruplā ipsius g k. quod cum e g, g f sint æquales, & h g, g k necessario æquales erunt. ergo ex qua rta propositione primi libri Archimedis de cē tro grauitatis planorū, totius octahedri, quod ex dictis pýramidibus constat, centrum grau tatis erit punctum g idem, quod ipsius sphæræ centrum.

Sit icosahedrum a d descriptum in sphéra, cuius centru sit g. Dico g ipsius icosahedri grauitatis esse centrum. Si enim ab angulo a per g ducatur rectâ linea usque ad sphæræ superficiem; constat ex sexta decima propositione libri tertii decimi elementorum, cadere eam in angulum ipsi a oppositum. cadat in d: fitq; una aliqua basis icosahedri triangulum a b c: & iunctæ b g, c g producantur, & cadant in angulos e f, ipsis b c oppositos. Itaque per triangula a b c, def ducantur plana spharam secantia. erunt hæ se-




FED. COMMANDINI

Actiones circuli ex prima propositione sphæricorum Theodosii: unus quidem circa triangulum a b c descriptus: alter uero circumscribitur: & quoniam triangula a b c, d e f æquilia sunt, & similia; erunt ex prima, & secunda propositione duodecimi libri elementorum, circuli quoque inter se æquales. postremo a centro g ad circulum a b c perpendicularis ducatur gh; & alia perpendicularis ducatur ad circumferentiam d e f, quæ sit g k; & iungantur ah, dh. perspicuum est ex corollario primæ sphæricorum Theodosii, punctum h centrum esse circuli a b c, & k centrum circuli d e f. Quoniam igitur triangulorum g a h, g d K latius ag est æquale lateri gd; sunt enim a centro sphærae ad superficiem: atque est ah æquale dk: & ex sexta propositione libri primi sphæricorum Theodosii gh ipsi g K: triangulum g a h æquale erit, & simile gd k triangulo: & angulus ag h, hg d sunt æquales duobus rectis. ergo & ipsi hg d, dg k duobus rectis æquales erunt. & idcirco hg, g K una, atque eadem erit linea. cum autem h sit centrum circuli, & trianguli a b c gravitatis centrum probabitur ex iis, quæ in prima propositione huius tradita sunt. quare gh erit pyramidis a b c g axis. & ob eandem causam g k axis pyramidis d e f g. Itaque centrum gravitatis pyramidis a b c sit puctum l, & pyramidis d e f g sit m: Similiter ut supra demonstrabimus m'g, gl inter se æquales esse, & punctum g' gravitatis centrum magnitudinis, quæ ex utriusque pyramidibus constat. eodem modo demonstrabitur, quarumcunque diarum pyramidum, quæ opponuntur, gravitatis centrum esse



esse punctum g. Sequitur ergo ut icosaedri centrum gravitatis sit idem, quod ipsius sphærae centrum.

Sit do-decahedrum a f in sphæra designatum, sitque sphærae centrum m. Dico m centrum esse gravitatis ipsius do-decahedri. Sit enim pentagonum a b c d e una ex duodecim basibus solidi a f: & iuncta a m producatur ad sphærae superficiem. cadet in angulum ipsi a oppositum; quod colligitur ex decima septima propositione tertii decimi libri elementorum. cadat in f. at si ab aliis angulis b c d e per centrum itidem linea ducantur ad superficiem sphærae in puncta g h k l; cadent haec in alios angulos basis, que ipsi a b c d basi opponuntur. transeant ergo per pentagona a b c d e, sg h k l plana sphæram secantia, quæ facient sectiones circulos æquales inter se se. postea ducantur ex centro sphærae m perpendiculares ad planas dictorum circulorum; ad circulum quidem a b c d e perpendicularis m n: & ad circulum f g h k l ipsa m o, erunt puncta n o circulorum centra: & linea m n, m o inter se æquales: quod circuli æquales sint. Eodem modo, quo supra, demonstrabis lineas m n, m o in unâ atque eandem lineam conuenire. ergo cum puncta n o sint centra circulorum, constat ex prima huius & pentagonorū gravitatis esse centra: idcircoq; m n, m o pyramidum a b c d e, sg h k l axes, ponatur a b c d e in pyramidis gravitatis centrum p: & pyramidis sg h k l ipsum q centrum. erunt p m, m q æquales, & punctum m gravitatis centrum magnitudinis, quæ ex ipsis pyramidibus constat. endé modo probabitur quæcumlibet pyramidum, quæ è regione opponuntur, centrū



corol. pri
mæ sphæ
ricorum
Theod.
6. primi
phærico
rum.

FED. COMMANDINI

grauitatis esse punctum m. patet igitur totius dodecahedri, centrum grauitatis id est esse, quod & sphæra ipsum comprehendens centrum. quæ quidem omnia demonstrasse oportebat.

PROBLEMA VI. PROPOSITIO XXVIII.

D A T A qualibet portione conoidis rectanguli, abscissa piano ad axem recto, vel non recto, fieri potest, ut portio solida inscribatur, vel circumscribatur ex cylindris, vel cylindri portionibus, æqualem habentibus altitudinem, ita ut recta linea, quæ inter centrum grauitatis portionis, & figuræ inscriptæ, vel circumscriptæ interiicitur, sit minor qualibet recta linea proposita.



Sit portio conoidis rectanguli a b c, cuius axis b d, grauitatisq; centrum e: & sit recta linea proposita. quam uero proportionem habet linea b e ad lineam g, eandem habeat portio conoidis ad solidum h: & circumscribatur portioni figura, sicuti dictum est, ita ut portiones reliquæ sint solidi h minores: cuius quidem figuræ centrum grauitatis sit punctum k. Dico lineam k e minorem esse linea g proposita. nisi enim sit minor, vel æqualis, vel maior erit. & quoniam figura circumscripta ad reliquas portiones maiorem proportionem habet, quam portio conoidis ad solidum h; hoc est maiorem, quam b e ad g: & b e ad g non minorem habet proportionem, quam ad k e, propterea quod k e non ponitur minor ipsa g: habebit figura circumscripta ad portiones reliquas maiorem proportionem quam b e ad e k: & diuidendo portio conoidis ad reliquas portiones habebit maiorem, quam b k ad K e. quare si fiat ut portio conoidis

2. quinti.

29. quinti
ex traditione Cæ-
pani.

noidis ad portiones reliquas, ita alia linea, que sit $l x$ ad $x e$; erit l maior quam $b k$: & ideo punctum l extra portionem cadet. Quoniam igitur a figura circumscripta, cuius gravitatis centrum est k , auferatur portio conoidis, cuius centrum e . habetq; $l K$ ad $K e$ eam proportionem, quam portio conoidis ad reliquias portiones; erit punctum l extra portionem cadens, centrum magnitudinis ex reliquis portionibus composite. illud autem fieri nullo modo potest: quare constat lineam k e ipsa g linea proposita minorem esse.

Rursus inscribatur portioni figura, videlicet cylindrus $m n$, ut sit ipsius altitudo æqualis dimidio axis $b d$: & quam proportionem habet $b e$ ad g , habeat $m n$ cylindrus ad solidum o . inscribatur deinde eidem alia figura, ita ut reliquæ sint solido o minores: & centrum gravitatis figuræ sit p . Dico lineam p e ipsa g minore esse. si enim non sit minor, eodem, quo supra modo demonstrabimus figuram inscriptam ad reliquias portiones maiorem proportionem habere, quam $b e$ ad $e p$. & si fiat alia linea l ead $e p$, ut est figura inscripta ad reliquias portiones, punctum l extra por-



FED. COMMANDINI

tionem cadet: Itaque cum à portione conoidis, cuius gravitatis centrum e auferatur inscripta figura, centrum habens p: & sit l e ad e p , ut figura inscripta ad portiones reliquas: erit magnitudinis, quae ex reliquis portionibus constat, centrum gravitatis punctum l, extra portionem cadiens . quod fieri nequit . ergo linea p e minor est ipsa linea proposita .

Ex quibus perspicuum est centrum gravitatis figuræ inscriptæ , & circumscripctæ eo magis accedere ad portionis centrum , quo pluribus cylindris, vel cylindri portionibus constet: fiatq; figura inscripta maior , & circumscripcta minor . & quanquam continenter ad portionis centrū proprius admoueatur: nunquam tamen ad ipsum perueniet. sequeretur enim figuram inscriptam , nō solum portioni , sed etiam circumscripctæ figuræ æqualem esse . quod est absurdum.

THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXIX.


CIVIS LIBET portionis conoidis rectanguli axis à centro gravitatis ita dividitur, ut pars qua terminatur ad uerticem, reliquæ partis, quæ ad basim sit dupla.

SIT portio conoidis rectanguli vel abscissa piano ad axem recto, vel non recto: & secta ipsa altero piano per axe sit superficie sectio ab c rectanguli coni sectio, vel parabola; plani abscidentis portionem sectio sit recta linea ac axis portionis, & sectionis diameter b d. Suniatur autem in linea b d punctum e, ita ut b e sit ipsius e dupla. Dito

e por-

DE CENTRO GRAVIT. SOLID.

e portionis a b
 c gravitatis esse
 centrum. Diui-
 datur enim b d
 bifariam in m :
 & rursus d m, m
 b bifariam diui-
 dantur in pun-
 ctis n, o: inscri-
 baturq; portio-
 ni figura solida,
 & altera circum-
 scribatur ex cy-
 lindris æqualem
 altitudinem ha-
 bentibus, ut su-
 perfus dictu est.
 Sit autem pri-
 mum figura in-
 scripta cylindrus
 f g: & circucri-
 pta ex cylindris
 a h, K l conser.
 punctum n erit
 centrum graui-
 tatis figuræ in-
 scriptæ, mediū
 scilicet ipsius d
 m axis: atq; idē
 erit centrum cy-
 lindri ah: & cy-
 lindri k l centru-
 m, axis b m me-
 dium, quare si li-



L 3

.

FEDE COMMANDINGE

neam o n ita di
uiserimus in p,
ut quā propo-
tionē habet cy-
lindrūs a h ad
cylindrum x l,
habeat linea o p

g. primi
libri Ar-
chimedis

ii. duo.
decimi.


estq; ut linea d b
ad b m, ita qua-
dratū linea a d
ad quadratū ip-
sius K m, ex uige-
fima ptimi libri

15. quinti
comorū: & ita
quadratum a c

ad quadratū K
g; hoc est circu-
lus circa diamete-
trum a c ad circu-
lum circa dia-
metrum k g. du-
pla est autem li-
nea d b linea

c J

d e a inquirere
d e inquirere
e inquirere
f inquirere
g inquirere
h inquirere
i inquirere
j inquirere
k inquirere
l inquirere
m inquirere
n inquirere
o inquirere
p inquirere
q inquirere
r inquirere
s inquirere
t inquirere
u inquirere
v inquirere
w inquirere
x inquirere
y inquirere
z inquirere




b m. ergo circulus a c circuli k g: & idcirco cylindri
 a h cylindri k l duplus erit. quare & linea opusculum
 ipsius b n. Deinde inscripta & circumscripta portioni
 alia figura, ita ut inscripta constituatur ex tribus cylin-
 dris qz, sg, tu: circumscripta uero ex quatuor ax, yz,
 K v, theta: diuidantur h o, o m, m n, n d bifariam in punctis
 mu, pi rho. Itaque cylindri theta centrum gravitatis est. punctum
 mu: & cylindri k l centrum v. ergo si linea mu dividatur in os
 ita ut mu ad o proportionem ea habeat, quam cylindrus K v
 ad cylindrum theta, uidehicit quam quadratum o m ad qua-
 dratum o n hoc est, quam linea m b ad b o: erit & centrum
 magnitudinis compositae ex cylindris k v, theta: & cum linea
 m b sit dupla b o, erit & mu ipsius o dupla praterea quo-
 niam cylindri yz centrum gravitatis est. linea o n ita di-
 sa in tau, ut o n ad tau pi eam habeat proportionem, quam cylin-
 drus yz ad duos cylindros K v, theta: erit & centrum magni-
 tudinis que ex dictis tribus cylindris constat. cylindri ps autem
 te yz ad cylindrum theta est, ut linea n b ad b o: hoc est ut 3
 ad 1: & ad cylindrum k v, ut n b ad b m, uidehicit ut 3 ad 2:
 quare yz cylindrus duobus cylindris k v, theta: aequalis erit: &
 propterea linea o n: aequalis ipsi tau pi. denique cylindri a x
 centrum gravitatis est punctum p. & cum o n diuisa fuerit
 in eam proportionem, quam habet cylindrus a x ad tres cy-
 lindros yz, k v, theta: erit in eo puncto centrum gravitatis
 totius figuræ circumscripæ. Sed cylindrus a x ad ipsum yz
 est ut linea d b ad b n: hoc est ut 4 ad 3: & duo cylindri k v
 theta cylindro yz sunt aequales. cylindri igitur a x ad tres
 iam dictos cylindros est ut 2 ad 3. Sed quoniam p: o n est dua-
 rum partium, & o n unius, qualium p: pi est sex, erit o n par-
 tum quatuor: proptereaq; tau pi quarum, & 2 pi, hoc est pi
 trium. quare sequitur ut punctum tau totius figuræ circum-
 scriptæ sit centrum. Itaque fiat v. ad tau pi, usque o n ad o n: & v p
 bifariam diuidatur in o. Similiter ut in circumscripta figu-
 ra ostendetur centrum magnitudinis compositæ ex cylindri

20. primi
conicoru

RED. COMMANDING.

dris s g, tu esse. b c
 punctum v: &
 totius figurae in
 scriptz, quæ co-
 stat ex cylindris
 qr, sg, fu esse d
 centrum. Sunt
 enim hi cylindri
 æquales & simi-
 les cylindr. yz.
 K, b, & a, figurae
 circumscripæ.
 Quoniam igitur
 ut b e ad d, ita
 est o p ad p n:
 utraq; enim u-
 triusque est du-
 pla: erit compo-
 nendo, ut b d ad
 de ita o n ad n
 p s & permutan-
 do, ut b d ad o
 n, ita d e ad n p:
 Sed b d dupla
 est o n. ergo &
 e d ipsius n p du-
 pla erit. quod si
 e d bifariam di-
 uidatur i x, erit
 x d, uel e x ar-
 qualis a p: &
 sublata e n, quæ
 est cōmuais u-
 trique e x p n,




a q f d e g h l j i x
 relin-

relinquetur p e ipsi n χ æqualis. cum autem b e sit dupla
 e d, & o p dupla p n, hoc est ipsius $\epsilon \chi$, & reliquum, uideli-
 cet b o unà cum p e ipsius reliqui χ d duplam erit. estque
 b o dupla ρ d. ergo p e, hoc est n χ ipsius χ p dupla. sed d n
 dupla est n ρ . reliqua igitur d χ dupla reliquæ χ n. sunt au-
 tem d χ , p n inter se æquales: itemq; æquales χ n, p e. qua-
 re constat n p ipsius p e duplam esse. & idcirco p e ipsi e n
 æqualem. Rursus cum sit μv dupla o v, & $\mu \sigma$ dupla σv ; erit
 etiam reliqua $v \sigma$ reliquæ σo dupla. Eadem quoque ratione
 cōcludetur πv dupla v m. ergo ut $v \sigma$ ad σo , ita πv ad v m:
 componendoq; & permutoando, ut v o ad πm , ita o σ ad
 m v: & sunt æquales v o, πm . quare & $\phi \sigma$, m v æquales. præ-
 terea $\sigma \pi$ dupla est $\pi \tau$, & v π ipsius πm . reliqua igitur σv re-
 liquæ m τ dupla. atque erat $v \sigma$ dupla, σo . ergo m τ , σo æ-
 quales sunt: & ita æquales m v, n ϕ . at o σ , est æqualis
 m v. Sequitur igitur, ut omnes o σ , m τ , m v, n ϕ in-
 ter se sint æquales. Sed ut p π ad $\pi \tau$, hoc est ut π ad χ . & sunt æqua-
 les $\rho \cdot \pi$, n d. ergo d χ ; hoc est n p, & $\pi \tau$ æquales. Sed etiam æ-
 quales n π , n m. reliqua igitur π p reliquæ m τ , hoc est ipsi
 n ϕ æqualis erit, quare denpta p π exp e, & ϕ n dempta ex
 n e, relinquitur p e æqualis e ϕ . Itaque π , p centra figurarū
 secundo loco descriptarum a primis centris p n æquali in-
 teruallo recedunt. quod si rursus alia figuræ describantur,
 eodem modo demonstrabimus earum centra æqualiter ab
 his recedere, & ad portionis conoidis centrum proprius ad
 moueri. Ex quibus constat lineam $\pi \phi$ à centro gravitatis
 portionis diuidi in partes æquales. Si enim fieri potest, non
 sit centrum in puncto e, quod est linea $\pi \phi$ medium: sed in
 \downarrow : & ipsi $\pi \downarrow$ æqualis fiat $\phi \omega$. Cum igitur in partione solidâ
 quedam figura inscribi possit, ita ut linea, quæ inter cen-
 trum gravitatis portionis, & inscriptæ figuræ interiicitur,
 qualibet linea proposita sit minor, quod proxime demon-
 strauimus: perueniet tandem ϕ centrum inscriptæ figuræ

19. quints

FED. COMMANDINI



ad punctum ω . Sed quoniam π circumscripta itidem alia figura æquali interuallo ad portionis centrum accedit, ubi primum ρ applicuerit se ad ω , & π ad punctū \downarrow , hoc est ad portionis centrum se applicabit. quod fieri nullo modo posse perspicuum est. non aliter idem absurdum sequetur, si ponamus centrum portionis recedere à medio ad partes ω ; esset enim aliquando centrum figuræ inscriptæ idem quod portionis centrū. ergo punctum e centrum erit gravitatis portionis a b c. quod demonstrare oportebat.

Quod autem supra demonstratum est in portione conoidis recta per figuræ, quæ ex cylindræ æqualem altitudinem habentibus constant, idem similiter demonstrabimus per figuræ ex cylindri portionibus constantes in ea portione, quæ plano non ad axem recto absinditur. ut enim tradidimus in commentariis in undecimam propositionem libri Archimedis de conoidibus & sphæroidibus. portiones cylindri, quæ æquali sunt altitudine eam inter se se proportionem habent, quam ipsarum bases : bases autem quæ sunt ellipses similes eandem proportionem habere, quam quadrata diametrorum eiusdem rationis, ex corollario septimus propositionis libri de conoidibus, & sphæroidibus, manifeste apparet.

corol. 15
de conoidibus &
sphæroidibus.


THEOREMA XXIII. PROPOSITIO XXX.

Si à portione conoidis rectanguli alia portio abscindatur, plano basi æquidistante; habebit portio tota ad eam, quæ abscissa est, duplam proportionem eius, quæ est basis maioris portionis ad basim minoris, uel quæ axis maioris ad axem minoris.

M

FED. COMMANDINI

ABSCINDATVR à portione conoidis rectangulari ab calia portio ebf, plano basi æquidistante: & eadem portio secetur alio plano per axem, ut superficie sectio sit parabole abc: planorum portiones abscidentium rectæ lineaæ ac, efi: axis autem portionis, & sectionis diameter bd; quam linea efin puncto g secet. Dico portionem conoidis abc ad portionem ebf duplam proportionem habere eius, quæ est basis ac ad basim ef; uel axis db ad bg axem. Intelligentur enim duo coni, seu coni portiones abc, ebf, eadem basim, quam portiones conoidis, & æqualem habentes altitudinem. & quoniam abc portio conoidis sesquialtera est coni, seu portionis coni abc; & portio ebf coni seu portionis coni ebf est sesquialtera, quod de-



monstrauit Archimedes in propositionibus 23, & 24 libri de conoidibus, & sphæroidibus: erit conoidis portio ad conoidis portionem, ut conus ad conum, uel ut coni portio ad coni portionem. Sed conus, uel coni portio abc ad conum, uel coni portionem ebf compositam proportionem habet ex proportione basis ac ad basim ef, & ex proportione altitudinis coni, uel coni portionis abc ad altitudinem ipsius ebf, ut nos demonstrauimus in commentariis in undecimam propositionem eiusdem libri Archimedis: altitudo autem ad altitudinem est, ut axis ad axem. quod quidem in conis rectis perspicuum est, in scalenis ue-

ro

ro ita demonstrabitur. Ducatur à puncto b ad planum basis ac perpendicularis linea b h , quæ ipsam e fin K fecet . erit b h altitudo coni , uel coni portionis a b c : & b K altitu do e f g . Quod cum lineæ a c , e f inter se æquidistant , sunt enim planorum æquidistantium sectiones : habebit d b ad b g proportionem eandem , quam h b ad b k . quare portio conoidis a b c ad portionem e f g proportionem habet compositam ex proportione basis a c ad basim e f ; & ex proportione d b axis ad axem b g . Sed circulus , uel ellipsis circa diametrum a c ad circulum , uel ellipsim circa e f , est ut quadratum a c ad quadratum e f ; hoc est ut quadratū a d ad quadratū e g . & quadratū a d ad quadratum e g est , ut linea d b ad lineam b g . circulus igitur , uel ellipsis circa diametrum a c ad circulum , uel ellipsim circa e f , hoc est basis ad basim eandem proportionem habet , quæ d b axis ad axem b g . ex quibus sequitur portionem a b c ad portionem e b f habere proportionem duplam eius , quæ est basis a c ad basim e f : uel axis d b ad b g axem . quod demonstrandum proponebatur .

16. unde
cuni.
4 sexti.

2. duode
cimi
7. de co
noidibus
& sphæ
roidibus
15. quinti
20. primi
conicorū

THEOREMA XXV. PROPOSITIO XXXI.

Cuiuslibet frusti à portione rectanguli conoidis abscisī , centrum gravitatis est in axe , ita ut demptis primum à quadrato , quod fit ex diametro maioris basis , tertia ipsius parte , & duabus tertiiis quadrati , quod fit ex diametro basis minoris : deinde à tertia parte quadrati maioris basis rursus dempta portione , ad quam reliquum quadrati basis maioris unā cum dicta portione duplā proportionem habeat eius , quæ est quadrati ma-

M 2

FED. COMMANDINE

ioris basis ad quadratum minoris: centrum sit in eo axis puncto, quo ita dividitur ut pars, quae minoris basim attingit ad alteram partem eandem proportionem habeat, quam dempto quadrato minoris basis à duabus tertiiis quadrati maioris, habet id, quod reliquum est unà cum portione à tertia quadrati maioris parte dempta, ad reliquā eiusdem tertiae portionem.

SIT frustum à portione rectanguli conoidis abscissum abcd, cuius maior basis circulus, vel ellipsis circa diametrum bc, minor circa diametrum ad, & axis ef. describatur autem portio conoidis, à quo illud abscissum est, & pla-



nō per axem ducto segetur; ut superficie sectio sit parabolæ bgc, cuius diameter, & axis portionis g f deinde g f dividatur in punto h, ita ut gh sit dupla h f. & rursus g e in eandem proportionem dividatur: sitq; g k ipsius ke dupla. Iā ex iis, quæ proxime demonstravimus, constat centrum gravitatis portionis bgc esse h punctum: & portionis agd punctum k. sumpto igitur infra h puncto l, ita ut k h ad hl eam.

eam proportionem habeat, quam abcd frustum ad portionem agd; erit punctum eius frusti gravitatis ceterum: habebitq; componendo Kl ad lh proportionem eandem, quam portio conoidis bgc ad agd portionem. Itaq; quoniam quadratum b f ad quadratum ae, hoc est quadratum b c ad quadratum ad est, ut linea fg ad ge: erunt duas tertiae quadrati bc ad duas tertias quadrati ad, ut hg ad gk; & si à duabus tertias quadrati bc dempta fuerint duas tertias quadrati ad: erit diuidedo id, quod relinquitur ad duas tertias quadrati ad, ut hk ad kg. Rursus duas tertias quadrati ad ad duas tertias quadrati bc sunt, ut kg ad gh: & duas tertias quadrati bc ad tertiam partem ipsius, ut gh ad hf. ergo ex æquali id, quod relinquitur ex duabus tertias quadrati bc, demptis ab ipsis quadrati ad duabus tertias, ad tertiam partem quadrati bc, ut kh ad hf: & ad portionem cinsde tertiae partis, ad quam unà cum ipsa portione, duplam proportionem habeat eius, quæ est quadrati bc ad quadratum ad, ut Kl ad lh. habet enim Kl ad lh eandem proportionem, quam conoidis portio bgc ad portionem agd: portio autem bgc ad portionem agd duplam proportionem habet eius, quæ est basis bc ad basim ad: hoc est quadrati bc ad quadratum ad; ut proxime demonstratum est. quare 30 huius dempto ad quadrato à duabus tertias quadrati bc, erit id, quod relinquitur unà cum dicta portione tertiae partis ad reliquam eiusdem portionem, ut elad lf. Cum igitur centrum gravitatis frusti abcd sit, a quo axis ef in eam, quā diximus, proportionem diuidatur; constat uerū esse illud, quod demonstrandum proposuimus.

20.1.coni
corun.

FINIS LIBRI DE CENTRO
GRAVITATIS SOLIDORVM.

Impress. Bononiæ cum licentia Superiorum.